

Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

Rx: Thuốc bán theo đơn

AESCIN 20mg

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nén bao phim.

Aescin/Escin 20mg

Tá dược vđ 1 viên

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị thiếu năng tĩnh mạch mãn tính, giãn tĩnh mạch chân, trĩ.
- Điều trị viêm tĩnh mạch chân.
- Phòng và điều trị tụ máu, chống viêm, chống phù nề sau phẫu thuật và chấn thương.

CÁCH DÙNG – LIỀU DÙNG: Dùng để uống.

- Người lớn: Uống 2 viên/lần x 3 lần/ngày. Uống thuốc sau khi ăn và uống với nhiều nước. Với mục đích phòng ngừa nên dùng trước khi phẫu thuật ít nhất 16 tiếng.

Sau 2-3 tháng điều trị có thể dùng liều duy trì với 40mg (2 viên) mỗi lần, ngày uống 2 lần.

- Người già: Không cần thiết phải điều chỉnh liều lượng.
- Trẻ em: Không khuyến cáo sử dụng

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng aescin cho những bệnh nhân:

- Quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Tuyệt đối không dùng cho những bệnh nhân suy thận cấp.
- Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

THẬN TRỌNG:

- Trong suốt thời gian sử dụng liệu pháp điều trị với alpha-escin, phải kiểm tra chức năng thận.
- Không nên sử dụng aescin với bệnh nhân có tiền sử bệnh không

dung nạp galactose, thiếu hụt lapp lactase hoặc kém hấp thu glucose- galactose.

- Aescin có chứa chất tạo màu vàng cam (E 110) có thể gây các phản ứng dị ứng.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Với bệnh nhân đang dùng thuốc tránh thai, có thể tăng gấp đôi liều dùng aescin.

- Aescin có thể làm tăng tác dụng của các thuốc chống đông. Kháng sinh cephalosporin có thể tăng tác dụng của aescin.

- Nên tránh dùng đồng thời aescin với kháng sinh nhóm aminoglycosid do khả năng tăng độc tính của kháng sinh nhóm aminoglycosid trên thận.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Rất hiếm gặp: Phản ứng quá mẫn, bao gồm nổi mề đay.

Hay gặp: Rối loạn đường tiêu hóa.

“ Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc ”

TRÌNH BÀY: Hộp 3 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên hoặc hộp 1 vỉ, hộp 10 vỉ x 30 viên nén bao phim.

BẢO QUẢN: Dưới 30^oC. Nơi khô mát, tránh ánh sáng.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng thuốc quá hạn

Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng

Cần Thêm Thông Tin Xin Hỏi Ý Kiến bác sỹ

Thuốc Sản Xuất Theo: TCCS



MIPHARMCO

CTY CỔ PHẦN DƯỢC MINH HẢI

322 - Lý Văn Lâm - P1 - TP. Cà Mau

ĐT: 0780 3831133 * Fax: 0780 3832676

<https://vnras.com/drug/>