# TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

*Rx Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc*

**1. Tên thuốc:** **BẠCH LONG THỦY**

**2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc:**

"ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG"

**3. Thành phần công thức thuốc:** Cho 1 chai 90ml

| | | |
|---|---|---|
| Xuyên bối mẫu | *Bulbus Fritillariae* | 7,0 g |
| Bách bộ | *Radix Stemonae tuberosae* | 7,0 g |
| Thiên môn đông | *Radix Asparagi cochinchinensis* | 7,0 g |
| Liên phòng | *Receptaculum Nelumbinis* | 7,0 g |
| Cát cánh | *Radix Platycodi grandiflori* | 7,0 g |
| Kinh giới | *Herba Elsholtziae ciliatae* | 7,0 g |
| Cam thảo | *Radix Glycyrrhizae* | 7,0 g |
| Tang bạch bì | *Cortex Mori albae radicis* | 7,0 g |
| Húng chanh | *Folium Plectranthi amboinici* | 7,0 g |
| Bạch chỉ | *Radix Angelicae dahuricae* | 7,0 g |
| Trần bì | *Pericarpium Citri reticulatae perenne* | 7,0 g |
| Sa sâm | *Radix Glehniae* | 7,0 g |
| Đường trắng | *Saccharum* | 27,0 g |
| ***Thành phần tá dược:*** | *Nước vừa đủ:* | 90ml |

**4. Dạng bào chế:** Cao lỏng.

**5. Chỉ định:** Tiêu đàm, trị ho gió, viêm họng, viêm phế quản, hen suyễn.

**6. Cách dùng, liều dùng:**

- Ngày uống 2-3 lần
- Người lớn: Uống mỗi lần 30ml
- Trẻ em : Từ 6 tháng đến dưới 2 tuổi uống mỗi lần 5 - 10ml

  Từ 2 tuổi đến 15 tuổi uống mỗi lần 15ml

(Bệnh nặng có thể dùng liều gấp đôi).

https://vnras.com/drug/

**7. Chống chỉ định:** Người đái tháo đường, trẻ em dưới 30 tháng tuổi có tiền sử động kinh, sốt cao co giật.

**8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:** Không dùng thuốc quá liều quy định hoặc sử dụng cùng lúc với thuốc khác.

**9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:** Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

**10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:** Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

**11. Tương tác, tương kỵ của thuốc:** Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác. Nếu có sử dụng thuốc khác, nên dùng cách nhau ít nhất 2 giờ.

Để bệnh hen suyễn mau hết, nên kiêng cữ các loại mắm, lòng heo, thịt gà, thịt trâu, thịt chó, bia, rượu, thuốc lá.

**12. Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

**13. Quá liều và cách xử trí:** Chưa có báo cáo liên quan đến quá liều của thuốc. Tuy nhiên cần phải sử dụng đúng liều chỉ định.

**14. Quy cách đóng gói:** Hộp 1 chai 90ml + ly định mức, kèm toa hướng dẫn sử dụng.

**15. Bảo quản:** Nơi thoáng mát, khô ráo, tránh ánh nắng, nhiệt độ < 30°C.

**16. Hạn dùng:** 18 tháng kể từ ngày sản xuất.

**17. Tiêu chuẩn chất lượng thuốc:** Theo TCCS

**18. Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất thuốc**

**CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC BẢO LONG**

Số 02, Đường 430, Ấp 1, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 37 922 993 - 37 922 994 Fax: (028) 37 922 991

Website: duocbaolong.vn Email: lienhe@duocbaolong.vn

https://vnras.com/drug/