https://vnras.com/drug/

BIOFLORA®

100 mg

Bột pha hỗn dịch uống

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ

THÀNH PHẦN

Saccharomyces boulardii CNCM I-745 . . . . . .100.00 mg

Tá dược: lactose monohydrate, fructose, silica keo khan, hương trái cây cho một gói 306 mg.

DẠNG BÀO CHẾ - QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Bột pha hỗn dịch uống đóng trong gói. Hộp 20 gói.

CHỈ ĐỊNH

- Điều trị tiêu chảy cấp ở người lớn và trẻ em kết hợp với bù nước bằng đường uống;
- Ngăn ngừa tiêu chảy khi dùng kháng sinh;
- Ngăn ngừa tái phát tiêu chảy do *Clostridium difficile.*

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Người lớn và trẻ em: 2 gói mỗi ngày, chia làm 2 lần.

Đường uống. Hoà tan thuốc trong gói vào ly nước.

Dạng đông khô của hoạt chất đảm bảo sự ổn định và khả năng sống của *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745 và nhanh chóng tạo hỗn dịch.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc

Bệnh nhân đặt catheter tĩnh mạch trung ương.

LƯU Ý

Không nên mở gói thuốc gần nơi bệnh nhân đặt catheter tĩnh mạch trung ương, tránh bất kỳ tiếp xúc nào vào catheter, đặc biệt là tay. Rất hiếm trường hợp nhiễm nấm trong máu ở bệnh nhân đặt catheter tĩnh mạch trung ương ngay cả khi không điều trị bằng *S. boulardii* CNCM I-745, hầu hết thường dẫn đến sốt và cấy máu dương tính với *Saccharomyces.*

Do có chứa lactose, không nên dùng thuốc này cho bệnh nhân bất dung nạp galactose, thiếu Lapp lactase hay hội chứng kém hấp thu glucose và galactose (bệnh chuyển hoá hiếm gặp).

Do có chứa fructose, không nên dùng thuốc này cho bệnh nhân bất dung nạp fructose.

THẬN TRỌNG KHI DÙNG

BIOFLORA có chứa tế bào nấm men sống phát triển ở 37°C, không nên trộn lẫn thuốc với nước uống có cồn, thức ăn hay thức uống quá nóng (trên 50°C) hay quá lạnh.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: không có

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC

Do bản chất nấm men, không kết hợp thuốc này với các thuốc kháng nấm.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Về mặt lâm sàng, không ghi nhận tác dụng gây dị dạng hay độc bào thai.

Do thận trọng, tốt hơn không dùng thuốc này trong thai kỳ.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Hệ miễn dịch: rất hiếm gặp phản ứng dị ứng (có thể phù Quincke), ban đỏ, ngứa.

Da và mô dưới da: hiếm gặp trường hợp nổi mề đay.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU

Do bản chất và đặc tính dược động học của thuốc, không có triệu chứng quá liều.

BẢO QUẢN - HẠN DÙNG

Để xa tầm tay trẻ em.

Bảo quản nhiệt độ dưới 30°C, tránh ẩm.

Không dùng quá hạn dùng ghi trên bao bì.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

39570/02

NHÀ SẢN XUẤT

BIOCODEX

1 avenue Blaise Pascal
60000 Beauvais - FRANCE