

BỔ GAN P/H



Thành phần: (cho 1 viên)

- Cao đặc Diệp hạ châu (*Extractum herbae phyllanthi urinariae*): 125mg
(tương đương với 1,25g dược liệu)
Cao đặc Bồ bồ (*Extractum herbae adenosmatis indiani*): 100mg
(tương đương với 1g dược liệu)
Cao đặc Chi tử (*Extractum fructi gardeniae*): 25mg
(tương đương với 0,25g dược liệu)

Tá dược (Avicel, tinh bột sắn, calci carbonat, magnesi stearat, đường kính, PVP K30, talc, lactose, nipagin, nipasol, sắt oxyd đỏ, sắt oxyd vàng, sáp ong trắng, carnauba wax, ethanol 96%, nước tinh khiết).....vừa đủ 1 viên

Dạng bào chế: Viên nén bao đường.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 60 viên, hộp 1 lọ x 100 viên, hộp 2 vỉ x 20 viên, hộp 5 vỉ x 20 viên.

Chỉ định:

- Trị viêm gan do virus, viêm gan vàng da cấp và mạn tính, men gan tăng, giải độc gan, mẩn ngứa, dị ứng, nổi mề đay.
- Bảo vệ và phục hồi chức năng gan cho những người uống nhiều rượu, bia, sử dụng thuốc điều trị lao dài ngày.

Cách dùng & liều dùng:

- Ngày uống 3 lần, mỗi lần 5 viên, uống sau bữa ăn.
- Bệnh nặng có thể dùng gấp rưỡi liều trên.
- Đợt điều trị 10 - 12 tuần.

Tác dụng phụ:

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Chống chỉ định: Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai.

Thận trọng: Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân tiểu đường.

Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc chống chỉ định cho phụ nữ có thai.

Phụ nữ cho con bú: Hiện vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Chưa có tài liệu, báo cáo nào của thuốc được ghi nhận.

Quá liều và cách xử trí: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi:

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng

Trụ sở: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Website: www.dongduocphuchung.com.vn

Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222

Fax: 04. 33978024

TUQ.CỤC TRƯỞNG

P.TRƯỞNG PHÒNG

Đỗ Minh Hùng