

Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Thuốc này chỉ dùng theo thuốc.

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC

Mỗi viên nang mềm chứa:
Thành phần hoạt chất: 20 mg
Isotretinoin
Thành phần tá dược:
Dầu báp, dầu lecithin, dầu củ sấp ong trắng, gelatin, glycerin đậm đặc, D-sorbitol 70%, ethyl vanillin, oxyd sắt đỏ, oxyd sắt đen, oxyd sắt vàng, titan dioxide, nước tinh khiết.

DẠNG BÀN CHÈ
Viên nang mềm hình oval, vỏ nang một nửa màu nâu, một nửa màu trắng, bên trong có chứa dịch thuốc màu vàng.

CHỈ ĐỊNH
Isotretinoin được chỉ định điều trị mụn trứng cá dạng nặng (như mụn trứng cá nang sẩn, mụn bọc hoặc mụn trứng cá có nang) có vẻ nặng và/hoặc không đáp ứng với liệu pháp điều trị thông thường bằng kháng sinh hoặc thuốc điều trị mụn thông thường khác.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG
Nên uống thuốc 1 đến 2 lần mỗi ngày trong bữa ăn.
Người lớn: Bắt đầu với liều 0,5 mg/kg mỗi ngày. Đáp ứng điều trị và một vài tác dụng bất Neben nicht da dring...
Mức độ thuyên giảm và tỷ lệ tái phát bệnh thường liên quan chặt chẽ đến tổng lượng thuốc đã dùng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Isotretinoin chống chỉ định cho phụ nữ có thai hoặc phụ nữ cho con bú.
Isotretinoin chống chỉ định cho người có khả năng mang thai.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC
Khả năng gây quái thai của isotretinoin rất cao. Vì vậy, không được dùng isotretinoin cho phụ nữ có thai hoặc có thể có thai khi dùng thuốc.

QUẢ LIỀU VÀ CÁCH NUTRI
Isotretinoin là một dạng của vitamin A. Mức độ độc tính cấp của isotretinoin thấp, nhưng có thể xuất hiện các tác dụng phụ không mong muốn.
Ngộ độc cấp vitamin A: Triệu chứng đầu tiên của ngộ độc cấp vitamin A là buồn nôn, nôn, chán ăn, kích ứng hoặc ngứa. Các dấu hiệu khác bao gồm mất cảm giác ngon miệng, giảm cân, đau khớp, cứng khớp, đau cơ và đau xương.

ĐẶC TÍNH THUỐC ĐỘNG HỌC
Isotretinoin được hấp thu nhanh và hoàn toàn qua đường tiêu hóa. Thời gian bán rã trung bình của isotretinoin là 10-20 giờ.
Isotretinoin được chuyển hóa chủ yếu thành 13-*cis*-isotretinoin và 9-*cis*-isotretinoin. Những chất chuyển hóa này cũng có hoạt tính dược lý.

QUẢ LIỀU VÀ CÁCH NUTRI (tiếp)
Isotretinoin là một dạng của vitamin A. Mức độ độc tính cấp của isotretinoin thấp, nhưng có thể xuất hiện các tác dụng phụ không mong muốn.
Ngộ độc cấp vitamin A: Triệu chứng đầu tiên của ngộ độc cấp vitamin A là buồn nôn, nôn, chán ăn, kích ứng hoặc ngứa. Các dấu hiệu khác bao gồm mất cảm giác ngon miệng, giảm cân, đau khớp, cứng khớp, đau cơ và đau xương.

ĐẶC TÍNH THUỐC ĐỘNG HỌC (tiếp)
Isotretinoin được hấp thu nhanh và hoàn toàn qua đường tiêu hóa. Thời gian bán rã trung bình của isotretinoin là 10-20 giờ.
Isotretinoin được chuyển hóa chủ yếu thành 13-*cis*-isotretinoin và 9-*cis*-isotretinoin. Những chất chuyển hóa này cũng có hoạt tính dược lý.

QUẢ LIỀU VÀ CÁCH NUTRI (tiếp)
Isotretinoin là một dạng của vitamin A. Mức độ độc tính cấp của isotretinoin thấp, nhưng có thể xuất hiện các tác dụng phụ không mong muốn.
Ngộ độc cấp vitamin A: Triệu chứng đầu tiên của ngộ độc cấp vitamin A là buồn nôn, nôn, chán ăn, kích ứng hoặc ngứa. Các dấu hiệu khác bao gồm mất cảm giác ngon miệng, giảm cân, đau khớp, cứng khớp, đau cơ và đau xương.

ĐẶC TÍNH THUỐC ĐỘNG HỌC (tiếp)
Isotretinoin được hấp thu nhanh và hoàn toàn qua đường tiêu hóa. Thời gian bán rã trung bình của isotretinoin là 10-20 giờ.
Isotretinoin được chuyển hóa chủ yếu thành 13-*cis*-isotretinoin và 9-*cis*-isotretinoin. Những chất chuyển hóa này cũng có hoạt tính dược lý.

QUẢ LIỀU VÀ CÁCH NUTRI (tiếp)
Isotretinoin là một dạng của vitamin A. Mức độ độc tính cấp của isotretinoin thấp, nhưng có thể xuất hiện các tác dụng phụ không mong muốn.
Ngộ độc cấp vitamin A: Triệu chứng đầu tiên của ngộ độc cấp vitamin A là buồn nôn, nôn, chán ăn, kích ứng hoặc ngứa. Các dấu hiệu khác bao gồm mất cảm giác ngon miệng, giảm cân, đau khớp, cứng khớp, đau cơ và đau xương.

con bú, vì khả năng xảy ra những tác dụng không mong muốn cho trẻ.
Khả năng sinh sản
Isotretinoin không làm ảnh hưởng đến số lượng, khả năng di chuyển và hình dạng của tinh trùng và không gây hại đến việc thụ tinh và phát triển phôi từ tinh trùng của những người đàn ông dùng thuốc này.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC
Isotretinoin có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. Việc lái xe hoặc vận hành máy móc trong thời gian đầu điều trị với isotretinoin và thời gian này tiềm ẩn nguy cơ cao đối với tai nạn giao thông. Do một số bệnh nhân, giảm thị lực ban đêm hoặc giảm độ nhạy cảm về thị giác ban đêm, được biết rằng trong này và được cảnh báo phải tránh lái xe trong khi sử dụng isotretinoin hoặc vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC
Isotretinoin có thể tương tác với vitamin A do có thể dẫn đến tình trạng như dùng vitamin A quá liều.
Một số trường hợp tăng áp lực nội sọ lành tính khi dùng đồng thời isotretinoin và tetracyclin được báo cáo, vì vậy tránh dùng đồng thời 2 thuốc này.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC
Các tác dụng không mong muốn thường gặp nhất khi điều trị với isotretinoin là các triệu chứng: Khô da, khô niêm mạc (chảy máu cam) và mắt (viêm kết mạc). Một số các tác dụng ngoài ý muốn của isotretinoin có liên quan đến liều sử dụng. Các tác dụng ngoài ý muốn phổ biến nhất khi dùng liều điều trị, tuy nhiên một số có thể tồn tại sau khi ngưng thuốc.

ĐỘ TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC
Isotretinoin được hấp thu nhanh và hoàn toàn qua đường tiêu hóa. Thời gian bán rã trung bình của isotretinoin là 10-20 giờ.
Isotretinoin được chuyển hóa chủ yếu thành 13-*cis*-isotretinoin và 9-*cis*-isotretinoin. Những chất chuyển hóa này cũng có hoạt tính dược lý.

QUẢ LIỀU VÀ CÁCH NUTRI (tiếp)
Isotretinoin là một dạng của vitamin A. Mức độ độc tính cấp của isotretinoin thấp, nhưng có thể xuất hiện các tác dụng phụ không mong muốn.
Ngộ độc cấp vitamin A: Triệu chứng đầu tiên của ngộ độc cấp vitamin A là buồn nôn, nôn, chán ăn, kích ứng hoặc ngứa. Các dấu hiệu khác bao gồm mất cảm giác ngon miệng, giảm cân, đau khớp, cứng khớp, đau cơ và đau xương.

ĐẶC TÍNH THUỐC ĐỘNG HỌC (tiếp)
Isotretinoin được hấp thu nhanh và hoàn toàn qua đường tiêu hóa. Thời gian bán rã trung bình của isotretinoin là 10-20 giờ.
Isotretinoin được chuyển hóa chủ yếu thành 13-*cis*-isotretinoin và 9-*cis*-isotretinoin. Những chất chuyển hóa này cũng có hoạt tính dược lý.

QUẢ LIỀU VÀ CÁCH NUTRI (tiếp)
Isotretinoin là một dạng của vitamin A. Mức độ độc tính cấp của isotretinoin thấp, nhưng có thể xuất hiện các tác dụng phụ không mong muốn.
Ngộ độc cấp vitamin A: Triệu chứng đầu tiên của ngộ độc cấp vitamin A là buồn nôn, nôn, chán ăn, kích ứng hoặc ngứa. Các dấu hiệu khác bao gồm mất cảm giác ngon miệng, giảm cân, đau khớp, cứng khớp, đau cơ và đau xương.

ĐẶC TÍNH THUỐC ĐỘNG HỌC (tiếp)
Isotretinoin được hấp thu nhanh và hoàn toàn qua đường tiêu hóa. Thời gian bán rã trung bình của isotretinoin là 10-20 giờ.
Isotretinoin được chuyển hóa chủ yếu thành 13-*cis*-isotretinoin và 9-*cis*-isotretinoin. Những chất chuyển hóa này cũng có hoạt tính dược lý.

QUẢ LIỀU VÀ CÁCH NUTRI (tiếp)
Isotretinoin là một dạng của vitamin A. Mức độ độc tính cấp của isotretinoin thấp, nhưng có thể xuất hiện các tác dụng phụ không mong muốn.
Ngộ độc cấp vitamin A: Triệu chứng đầu tiên của ngộ độc cấp vitamin A là buồn nôn, nôn, chán ăn, kích ứng hoặc ngứa. Các dấu hiệu khác bao gồm mất cảm giác ngon miệng, giảm cân, đau khớp, cứng khớp, đau cơ và đau xương.

ĐẶC TÍNH THUỐC ĐỘNG HỌC (tiếp)
Isotretinoin được hấp thu nhanh và hoàn toàn qua đường tiêu hóa. Thời gian bán rã trung bình của isotretinoin là 10-20 giờ.
Isotretinoin được chuyển hóa chủ yếu thành 13-*cis*-isotretinoin và 9-*cis*-isotretinoin. Những chất chuyển hóa này cũng có hoạt tính dược lý.

QUẢ LIỀU VÀ CÁCH NUTRI (tiếp)
Isotretinoin là một dạng của vitamin A. Mức độ độc tính cấp của isotretinoin thấp, nhưng có thể xuất hiện các tác dụng phụ không mong muốn.
Ngộ độc cấp vitamin A: Triệu chứng đầu tiên của ngộ độc cấp vitamin A là buồn nôn, nôn, chán ăn, kích ứng hoặc ngứa. Các dấu hiệu khác bao gồm mất cảm giác ngon miệng, giảm cân, đau khớp, cứng khớp, đau cơ và đau xương.

