

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CẢM XUYÊN HƯƠNG

YÊN BÁI



• Tên thuốc: CẢM XUYÊN HƯƠNG

• Khuyến cáo:

"*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*"

"*Để xa tầm tay trẻ em*"

"*Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc*"

• Thành phần công thức cho 1 viên nang cứng:

Thành phần Hoạt chất	Tên khoa học	Hàm lượng
Mỗi viên nang cứng chứa: 455 mg bột mịn hỗn hợp dược liệu tương đương với các dược liệu:		
Xuyên khung	<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>	206 mg
Bạch chỉ	<i>Radix Angelicae dahuricae</i>	232 mg
Hương phụ	<i>Rhizoma Cyperi</i>	195 mg
Quế chi	<i>Ramulus Cinnamomi</i>	9 mg
Sinh khương	<i>Rhizoma Zingiberis</i>	70 mg
Cam thảo bắc	<i>Radix Glycyrrhizae</i>	7,5 mg

Thành phần tá dược : PVP, Bột Talc vừa đủ 1 viên

• **Dạng bào chế:** Viên nang cứng, thân nang màu xanh nhạt, nắp nang màu xanh đậm, bên trong chứa bột thuốc màu nâu, mùi thơm dược liệu, vị tê đắng.

• **Quy cách đóng gói:**

Thuốc được đóng 10 viên/vi, 6 vi/1 túi methalight + 1 tờ HSDS/ hộp giấy cứng hoặc 10 vi/1 túi methalight + 1 tờ HSDS/ hộp giấy cứng.

• **Chỉ định:** Điều trị các trường hợp cảm cúm, cảm lạnh, nhức đầu, hắt hơi, sổ mũi do cảm lạnh.

• **Liều dùng và cách dùng:**

Liều dùng: ngày uống 3-4 lần

+ Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi: mỗi lần 3-4 viên.

+ Trẻ em từ 30 tháng tuổi-12 tuổi: mỗi lần 1-2 viên.

Cách dùng:

+ Uống thuốc với nước đun sôi để nguội.

• **Ghi chú:**

+ Nên uống thuốc với một cốc nước đầy, tốt nhất là từ 100-200ml nước/lần

+ Sau khi uống thuốc nên ăn nhẹ một bát nhỏ cháo hành còn nóng để tăng hiệu quả điều trị.

+ Một đợt dùng thuốc từ 3 - 5 ngày.

• **Chống chỉ định:** Không dùng cho phụ nữ có thai, người đang chảy máu, rối loạn chảy máu, người cảm nhiệt, tăng huyết áp, đang có xuất huyết, trẻ em dưới 30 tháng tuổi, có tiền sử động kinh, sốt cao, co giật và có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

• **Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:** Mặc dù ít khi xảy ra nhưng không loại trừ trường hợp bệnh nhân có thể mắc bệnh cúm do các loại virus nguy hiểm như virus cúm lợn, cúm gia cầm và một số loại virus cúm A khác. Vì vậy trong quá trình điều trị, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bệnh để phát hiện và xử trí kịp thời.

• **Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:**

- Thuốc chống chỉ định cho phụ nữ có thai.

- Trường hợp phụ nữ cho con bú: Hiện vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú.

• **Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc:**

Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

• **Tương tác, tương kỵ của thuốc:**

- **Tương tác của thuốc:**

+ Thuốc có thể bị giảm tác dụng nếu dùng đồng thời với các thuốc hoặc món ăn có tính hàn lạnh, do vậy không dùng đồng thời với các thuốc có tính hàn lạnh và tránh ăn hải sản và các món ăn có tính hàn lạnh khi dùng thuốc.

+ Chưa ghi nhận được các tài liệu hoặc báo cáo nào về tương tác của thuốc với các thuốc tây y, nhưng nếu phải dùng đồng thời với thuốc tây y thì tốt nhất nên uống cách nhau 2h

- **Tương kỵ của thuốc:** Do không có nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

• **Tác dụng không mong muốn:** Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. Phải thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ khi có bất cứ dấu hiệu bất thường nào xảy ra khi sử dụng thuốc.

• **Quá liều và cách xử trí:**

- Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

- Cách xử trí khi dùng thuốc quá liều: tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

• **Bảo quản:** Để nơi khô, thoáng, nhiệt độ không quá 30°C.

• **Hạn dùng của thuốc:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

• **Tiêu chuẩn:** TCCS



Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM YÊN BÁI
725 đường Yên Ninh - TP. Yên Bái.
Tel: 0216 3852523 / Fax: 0216 3850364



Tiếp thị và phân phối bởi:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM BẾN TRE

Địa chỉ: Số 6A3, Quốc lộ 60, Phường Phú Tân, TP. Bến Tre.

VPDD: Số 11 Nguyễn Trọng Quyền, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. HCM.

Tel: 028 36220205/ Fax: 028 39610613. Email: bepharco.vietnam@bepharco.com

Website: www.bepharco.com