

Để xa tâm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

CÔNG THỨC: Cho 1 chai 90 ml

- Thành phần hoạt chất:

Ích mẫu (*Herba Leonuri japonici*).....72,00 g

Hương phụ (*Rhizoma Cyperi*).....22,50 g

Ngải cứu (*Herba Artemisiae vulgaris*).....18,00 g

- Thành phần tá dược:

Đường trắng, ethanol 96%, nước tinh khiết.

DẠNG BÀO CHẾ: Cao lỏng.

Mô tả sản phẩm: Chất lỏng sánh, màu nâu đen, mùi thơm dược liệu đặc trưng, vị ngọt, đắng.

TÁC DỤNG:

Ôn kinh, chỉ huyết, tán hàn, chỉ thống.

CHỈ ĐỊNH:

Kinh nguyệt không đều (bao gồm vòng kinh dài, vòng kinh ngắn hay vòng kinh dài ngắn không đều), đau bụng kinh.

Rối loạn kinh nguyệt trong thời kỳ mới có kinh và tiền mãn kinh (bao gồm vòng kinh dài, vòng kinh ngắn hay vòng kinh dài ngắn không đều).

Các triệu chứng trong giai đoạn tiền mãn kinh như cảm giác nóng bừng mặt, nhức đầu, cáu gắt, đau bụng.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 muỗng canh (15 ml).

Hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Phụ nữ có thai.

Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG:

Cho đến nay chưa có thông tin báo cáo về các trường hợp cần thận trọng khi dùng thuốc.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai: không được sử dụng.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú: được sử dụng.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Không ảnh hưởng.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỶ:

a) Tương tác của thuốc:

Cho đến nay chưa có thông tin báo cáo về tương tác thuốc.

b) Tương kỵ của thuốc:

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 1 chai x 90 ml.

Hộp 1 chai x 100 ml.

Hộp 1 chai x 180 ml.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Sản xuất tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm OPC
tại Bình Dương - Nhà Máy Dược Phẩm OPC - Số 09/ĐX04-TH
Tổ 7, Ấp Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương