

Detyltaty!

CÔNG THỨC:

Mepheneşine.....250 mg

Tá dược: tinh bột ngô; povidon (PVP); magnesi stearat; aerosil; talc; titan dioxyd; đường trắng; gôm Arabic; gelatin; calci carbonat; natri benzoate; màu đỏ Ponceau 4R; màu vàng Tartrazin; màu vàng Sunset; sáp carnauba vừa đủ 1 viên bao đường.

DẠNG BÀO CHẾ: viên bao đường màu đỏ cam.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

- Hộp 2 vỉ x 25 viên

- Hộp 10 vỉ x 25 viên

- Chai 100 viên.

DƯỢC LỰC HỌC:

Thuốc thư giãn cơ có tác dụng trung ương. Gây thư giãn và trấn tĩnh nhẹ theo cơ chế phong bế thần kinh cơ có tác dụng toàn thân và cũng có tác dụng tại nơi thuốc tiếp xúc. Lợi ích của thuốc bị hạn chế do thời gian tác dụng ngắn.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Mephenesin được hấp thụ nhanh qua đường tiêu hóa và được phân bố hầu hết các mô trong cơ thể, đạt nồng độ cao trong máu chưa đến 1 giờ. Mephenesin được chuyển hóa chủ yếu ở gan. Mephenesin được bài tiết ra nước tiểu chủ yếu ở dạng đã chuyển hóa và một phần dạng thuốc chưa biến đổi.

CHỈ ĐỊNH:

Mephenesin được sử dụng điều trị hỗ trợ các cơn đau co cứng cơ trong các bệnh thoái hóa đốt sống và các rối loạn tư thế cột sống, vẹo cổ, đau lưng, đau thắt lưng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mephenesin được coi là sử dụng không an toàn cho người bệnh bị rối loạn chuyển hóa porphyrin.

Những người dị ứng với mephenesin và các thành phần khác của thuốc.

THẬN TRỌNG:

Những người bệnh có tiền sử dị ứng, hen phế quản, phản ứng dị ứng với thuốc, đặc biệt dị ứng với aspirin. Người có bệnh ở đường hô hấp, yếu cơ, có tiền sử nghiện thuốc, suy chức năng gan thận. Sử dụng đồng thời rượu với thuốc có thể làm tăng tác dụng không mong muốn.

Thuốc gây buồn ngủ và làm giảm khả năng phối hợp các động tác nên người sử dụng thuốc không được lái xe và sử dụng máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Các tác dụng trên hệ thần kinh trung ương của mephenesin có thể tăng cường nếu trong thời gian dùng thuốc có uống rượu hoặc dùng các chất ức chế hệ thần kinh khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Mephenesin có thể có những tác dụng không mong muốn như co giật, run rẩy, co cứng bụng, buồn nôn, toát mồ hôi, buồn ngủ, đau khớp, chảy, táo bón, phát ban. Triệu chứng này thường xảy ra ở những người bệnh phải dùng thuốc kéo dài.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Dùng đường uống.
Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi dùng theo đường uống từ 1,5 đến 3 mg/lần x 3 lần/ngày, chia làm 3 lần (500 mg/lần x 3 lần/ngày).

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:

Sử dụng thuốc quá liều có các dấu hiệu lâm sàng: giảm trương lực cơ, huyết áp, rối loạn thị giác, ngủ gà, mất phổi hợp đồng tác, ảo giác, hô hấp và hôn mê.

Quá liều gây co giật ở trẻ em và có thể gây xúc động mạnh và lú lẫn người già.

Trong tất cả trường hợp quá liều, người bệnh cần theo dõi cẩn thận hô hấp, mạch và huyết áp.

Nếu người bệnh còn tỉnh táo cần xử lý ngay bằng cách gây nôn, rửa dạ dày và điều trị các triệu chứng. Trường hợp bệnh nhân đã mất ý thức làm hô hấp nhân tạo và chuyển người bệnh đến cơ sở chuyên khoa nhất.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Chưa có đủ dữ liệu đáng tin cậy để đánh giá về khả năng gây dị tật thai nhi khi dùng mephenesin trong thời kỳ mang thai, vì vậy không dùng thuốc này cho phụ nữ đang mang thai.

Không dùng mephenesin trong thời kỳ cho con bú.

ĐỐI VỚI NGƯỜI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Do thuốc có thể gây buồn ngủ và làm giảm khả năng phối hợp các tác cho nên người bệnh sử dụng mephenesin không được lái xe, vận hành máy móc.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Thông báo với bác sĩ những tác dụng không muốn gặp phải sử dụng thuốc

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

221B - Phạm Văn Thuận - P. Tân Tiến - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai - Vi

ĐT: 061.3823107 Fax: 061. 3821608

E-mail: donai_pharm@yahoo.com