



Mẫu nhãn hộp viên nang mềm EBLAMIN



EBLAMIN[®]
Cao khô *Carduus marianus* 95% (k/k) 200 mg


Hộp 12 Viên nang mềm



EBLAMIN[®]
Cao khô *Carduus marianus* 95% (k/k) 200 mg

Hộp 12 Viên nang mềm

"ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG"
"ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM"



Liều dùng thông thường cho người lớn: mỗi lần 1 viên nang, 2-3 lần/ngày.
Liều dùng có thể thay đổi theo tuổi và tình trạng của bệnh nhân.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH & TÁC DỤNG PHỤ
Xin độc kỹ lưỡng dẫn sử dụng.
ITÊU CHUẨN TCS.
(BAO QUẢN) Trong bao bì kín, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ phòng không quá 30°C.
(BÔNG GÓI)
5 Viên nang mềm Vx 6 Viên nhũm x 2 Túi nhôm/Hộp.
Các thông tin khác, xin xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo hộp.

ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI
CÔNG TY CP KOREA UNITED PHARM. INT'L
THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM

Liều dùng các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, khó chịu ở dạ dày.
Liều dùng các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, khó chịu ở dạ dày.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 05/07-2018

Kích thước : 13 cm x 9 cm x 6 cm
Tỷ lệ: 75%



EBLAMIN[®]
Extractum *Carduus marianus* 95% (w/w) 200 mg

"READ INSERT-PAPER CAREFULLY BEFORE USING"
"KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN"



Liều dùng thông thường cho người lớn: mỗi lần 1 viên nang, 2-3 lần/ngày.
Liều dùng có thể thay đổi theo tuổi và tình trạng của bệnh nhân.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH & TÁC DỤNG PHỤ
Xin độc kỹ lưỡng dẫn sử dụng.
ITÊU CHUẨN TCS.
(BAO QUẢN) Trong bao bì kín, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ phòng không quá 30°C.
(BÔNG GÓI)
5 Viên nang mềm Vx 6 Viên nhũm x 2 Túi nhôm/Hộp.
Các thông tin khác, xin xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo hộp.

ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI
CÔNG TY CP KOREA UNITED PHARM. INT'L
THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM

Liều dùng các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, khó chịu ở dạ dày.
Liều dùng các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, khó chịu ở dạ dày.

Số lô SX : _____
Ngày sản xuất : _____
Hạn dùng : _____
Số đăng ký : _____

(COMPOSITION) Each soft capsule contains:
Extractum *Carduus marianus* 95% (w/w).....200 mg
(Equivalent to Silymarin 140 mg, Silybin 60 mg)
(DESCRIPTION) Each dark red colored, oblong soft capsule is filled with brownish yellow liquid.
(INDICATIONS)
Supportive treatment of toxic liver diseases, hepatocyte protection in administration of liver toxicant chronic hepatitis, hepatic cirrhosis.
Relief of symptoms of indigestion and upset stomach.
(DOSAGE & ADMINISTRATION)
Adults: 1 capsule, two or three times daily.
The dosage may vary according to a patient's age and condition.
(CONTRAINDICATIONS & ADVERSE EFFECTS)
Refer prescribing information enclosed.
(SPECIFICATION) In-house specification.
(STORAGE) In air-tight container, protected from light.
Store at room temperature not exceeding 30°C.
(PACKAGE)
5 Soft caps / Blister 6 Blister / Aluminium foil bag / 2 Aluminium foil bag / Box
For full prescribing information, please see enclosed leaflet.
Manufactured by
KOREA UNITED PHARM. INT'L JSC
No. 24, Doocanh Street, Ho Chi Minh City, Vietnam



Kwon Young Sun
Deputy General Director

33870 BS1

502/162 33870-bs1

Mẫu nhãn vỉ viên nang mềm EBLAMIN

Số lô SX, hạn dùng được in nổi lên vỉ



Kwon Young Sam
Deputy General Director

Công ty Cổ Phần Korea United Pharm. Int'l
Thuận An, Bình Dương, Việt Nam.

Mẫu nhãn túi nhôm viên nang mềm EBLAMIN

Số lô SX, hạn dùng được in lên túi nhôm

Số lô SX: xxxxxxxx HD: dd/mm/yy

EBLAMIN Cao khô <i>Carduus marianus</i> 95% (K/K) 200 mg CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA UNITED PHARM INT'L	EBLAMIN Cao khô <i>Carduus marianus</i> 95% (K/K) 200 mg CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA UNITED PHARM INT'L	EBLAMIN Cao khô <i>Carduus marianus</i> 95% (K/K) 200 mg CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA UNITED PHARM INT'L	EBLAMIN Cao khô <i>Carduus marianus</i> 95% (K/K) 200 mg CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA UNITED PHARM INT'L
EBLAMIN Cao khô <i>Carduus marianus</i> 95% (K/K) 200 mg CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA UNITED PHARM INT'L	EBLAMIN Cao khô <i>Carduus marianus</i> 95% (K/K) 200 mg CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA UNITED PHARM INT'L	EBLAMIN Cao khô <i>Carduus marianus</i> 95% (K/K) 200 mg CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA UNITED PHARM INT'L	EBLAMIN Cao khô <i>Carduus marianus</i> 95% (K/K) 200 mg CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA UNITED PHARM INT'L
EBLAMIN Cao khô <i>Carduus marianus</i> 95% (K/K) 200 mg CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA UNITED PHARM INT'L	EBLAMIN Cao khô <i>Carduus marianus</i> 95% (K/K) 200 mg CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA UNITED PHARM INT'L	EBLAMIN Cao khô <i>Carduus marianus</i> 95% (K/K) 200 mg CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA UNITED PHARM INT'L	EBLAMIN Cao khô <i>Carduus marianus</i> 95% (K/K) 200 mg CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA UNITED PHARM INT'L
EBLAMIN Cao khô <i>Carduus marianus</i> 95% (K/K) 200 mg CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA UNITED PHARM INT'L	EBLAMIN Cao khô <i>Carduus marianus</i> 95% (K/K) 200 mg CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA UNITED PHARM INT'L	EBLAMIN Cao khô <i>Carduus marianus</i> 95% (K/K) 200 mg CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA UNITED PHARM INT'L	EBLAMIN Cao khô <i>Carduus marianus</i> 95% (K/K) 200 mg CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA UNITED PHARM INT'L

S.G.N. 15-03-000249-P
CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA UNITED PHARM INT'L
KOREA UNITED PHARM INT'L
TX THUAN AN
BINH DINH

Koon, Young Sam
Deputy General Director

Công ty Cổ Phần Korea United Pharm. Int'l
Thuận An, Bình Dương, Việt Nam.

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

EBLAMIN - Viên nang mềmCao khô *Carduus marianus* 95% (kl/kl) 200 mg**THÀNH PHẦN**

Mỗi viên nang mềm chứa:

Cao khô *Carduus marianus* 95% (kl/kl).....200 mg*(Carduus marianus* L. Gaertn.)

(Tương đương Silymarin 140 mg; Silybin 60 mg)

Tá dược: Dầu đậu nành, Sáp ong trắng, Lecithin, Dầu cọ, Gelatin, Glycerin đậm đặc, Dung dịch sorbitol, Glycin, Acid citric khan, Methyl para-hydroxybenzoat, Propyl para-hydroxybenzoat, Ethyl vanilin, Màu xanh số 1 (Brilliant Blue FCF), Màu đỏ số 40 (Allura red AC), Titan dioxyd.

MÔ TẢ

Viên nang mềm hình thuôn dài, màu đỏ sẫm, bên trong chứa dịch thuốc màu vàng nâu.

CHỈ ĐỊNH

Hỗ trợ điều trị các bệnh nhiễm độc gan, bảo vệ tế bào gan khi dùng các chất gây độc cho gan, viêm gan mãn tính, xơ gan.

Làm giảm các triệu chứng của rối loạn tiêu hóa, khó chịu ở dạ dày.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Liều dùng thông thường cho người lớn: mỗi lần 1 viên nang, 2 – 3 lần/ ngày.

Liều dùng có thể thay đổi theo tuổi và tình trạng của bệnh nhân.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng thuốc ở những bệnh nhân sau:

- Mẫn cảm với thành phần của thuốc.
- Bệnh nhân bị tắc đường mật.
- Trẻ em dưới 12 tuổi.
- Người bị bệnh tiểu đường.

THẬN TRỌNG

Phụ nữ có thai và cho con bú cần tham khảo ý kiến Bác sĩ hay Dược sĩ trước khi sử dụng thuốc.



Ngưng sử dụng thuốc và thông báo cho Bác sĩ hay Dược sĩ khi xảy ra triệu chứng:

- Đau dạ dày hoặc tiêu chảy.
- Các biểu hiện dị ứng với thuốc.

Khi sử dụng thuốc:

- Không nên dùng thuốc quá liều chỉ định.
- Hỏi ý kiến Bác sĩ hoặc Dược sĩ nếu bệnh nhân bị vàng da.
- Nếu triệu chứng bệnh không được cải thiện sau thời gian dài sử dụng thuốc, hay sau 1 tháng, cần hỏi lại ý kiến Bác sĩ hoặc Dược sĩ.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Không dùng chung với levodopa.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Hiếm khi xảy ra các trường hợp rối loạn tiêu hóa và ban da dị ứng.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

SỬ DỤNG THUỐC Ở NGƯỜI MANG THAI VÀ CHO CON BÚ

Chưa có thông tin về việc sử dụng thuốc an toàn ở phụ nữ có thai và cho con bú.

ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có dữ liệu nghiên cứu về ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ

Triệu chứng: Thuốc không độc ngay cả khi dùng với liều cao. Khi quá liều có thể làm gia tăng các tác dụng không mong muốn và có thể gây nhuận tràng nhẹ.

Xử trí: Không cần điều trị đặc biệt, các triệu chứng trên nói chung sẽ hết trong vòng 24 đến 48 giờ khi ngưng dùng thuốc.

ĐÓNG GÓI

5 Viên nang mềm/ Vi x 6 Vi/ Túi nhôm x 2 Túi nhôm/ Hộp.

BẢO QUẢN

Trong bao bì kín, tránh ánh sáng. Ở nhiệt độ phòng không quá 30°C.

HẠN DÙNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng ghi trên hộp.



TIÊU CHUẨN

TCCS.

Để xa tầm tay của trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.


Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Sản xuất tại

CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA UNITED PHARM. INT'L

Số 2A, Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam.

Kwon Young Sam
Phó Tổng Giám Đốc
Cơ sở sản xuất và đăng ký thuốc



TUỘC CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy

