



Tờ hướng dẫn sử dụng

GELACMEIGEL

Metronidazol 1%
Gel bôi da

CÔNG THỨC: Mỗi tuýp thuốc 15 gam có chứa:

Metronidazol.....0,15g

Tá dược: Carbomers, Propylen glycol, Triethanolamin, Isopropyl alcohol, Methylparaben, Nước cất vừa đủ...15 g

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị mụn mủ viêm, các bệnh nhiễm khuẩn ngoài da do vi khuẩn kỵ khí, giúp mau lành vết loét, vết bỏng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Bệnh nhân mẫn cảm với dẫn chất Nitro Imidazol hoặc các thành phần của thuốc.

LIỀU DÙNG- CÁCH DÙNG:

Sau khi rửa sạch và làm khô vùng bị tổn thương, bôi một lớp mỏng thuốc 1- 2 lần / ngày , dùng trong 8 tuần.

THẬN TRỌNG:

Chỉ bôi ngoài da, tránh để thuốc dính vào mắt. Nếu có tình trạng kích ứng hay nhạy cảm, ngưng điều trị hỏi ý kiến Bác sĩ.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Metronidazol phối hợp với Spiramicin hoặc các kháng sinh khác (Neomycin; Kanamycin) đặc biệt Bêta lactam để chống lại các vi khuẩn ái khí, kỵ khí.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Cần thận trọng, chỉ nên dùng thuốc khi có sự chỉ dẫn của bác sĩ.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Có thể gặp mẫn ngứa, ban đỏ, kích ứng. Nếu xảy ra bệnh nhân có thể giảm số lần bôi hoặc ngưng dùng thuốc và hỏi ý kiến của thầy thuốc.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Triệu chứng : Kích ứng tại chỗ, đỏ da, nóng rát.

Điều trị: Ngưng dùng thuốc.

LỜI KHUYẾN CÁO:

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ.

Để xa tầm tay của trẻ em.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:

Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Tuýp 15 gam, hộp 1 tuýp.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng thuốc quá 30 ngày kể từ khi mở nắp tuýp thuốc.

llh



CTCP DƯỢC TƯ MEDIPHARCO-TENAMYD
8 Nguyễn Trường Tộ - Tp Huế - Việt Nam
ĐT: 054 3823099 - 3827215 Fax: 054 3826077

Huế, ngày 23 tháng 05 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Bình

https://trungtamthuoc.com/