

Idarac®

floctafenine

GIẢM ĐAU HỮU HIỆU MỨC ĐỘ NHẸ ĐẾN TRUNG BÌNH

THÔNG TIN TÓM TẮT SẢN PHẨM

THÀNH PHẦN:

Floctafenin..... 200 mg
Tá dược.....vd 1 viên

DẠNG TRÌNH BÀY:

Hộp 2 vỉ x 10 viên nén

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị các chứng đau mức độ nhẹ đến trung bình.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Liều lượng:
 - Chỉ dùng cho người lớn.
 - Liều dùng có thể thay đổi tùy theo loại đau, 1-2 viên/lần, các liều cách nhau 6-8 giờ.
 - Trung bình 4 viên/ ngày, tối đa 6 viên/ ngày.
- Cách dùng:
 - Uống với 1 ly nước.
 - Thuốc có thể được uống nguyên viên, hoặc tốt hơn, hòa trước trong nước.

Luôn luôn theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Dị ứng với floctafenin hoặc các chất tương tự (glafenin, antrafenin).
- Phối hợp với các thuốc chẹn beta.
- Suy tim nặng.
- Bệnh tim thiếu máu cục bộ (một số bệnh tim với lượng máu đến nuôi tim giảm)

THẬN TRỌNG:

- Tránh dùng lặp đi lặp lại các liều đơn độc.
- Bảo cho bác sĩ biết nếu có bệnh thận.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không chỉ định Idarac ở phụ nữ có thai và cho con bú.

NGƯỜI LÁI XE HOẶC SỬ DỤNG MÁY MÓC:

Lưu ý nguy cơ buồn ngủ khi dùng thuốc này.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Các tai biến dạng dị ứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng, người bệnh không được dùng thuốc này và các thuốc tương tự:
 - Mày đay, phù mạch thần kinh (sưng thanh môn và thanh quản).
 - Tai biến dị ứng xảy ra trung bình 30 phút sau khi dùng thuốc, với cảm giác kim châm và nóng bỏng ở bàn tay, bàn chân và mặt, đột ngột đỏ ửng ở mặt và phần ngực trên, ngứa thanh quản, phát ban ở da hoặc sưng mí mắt, hồng ban toàn thân(đỏ ửng) với ngứa, cảm giác khó chịu toàn thân và có thể tiến

triển đến mức mất tri giác.

- + Khó thở dạng suyễn
- + Bệnh thận cấp với lượng nước tiểu giảm.

Những rối loạn này có thể xảy ra ở người đã trở nên nhạy cảm với thuốc do lần sử dụng trước, phải ngưng dùng thuốc này, không được dùng lại thuốc và báo bác sĩ.

- Rất hiếm gặp: buồn nôn, nôn; buồn ngủ; cảm giác nóng rất khi tiểu.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Tất cả các thuốc mà bệnh nhân đang sử dụng đều phải báo cho bác sĩ, đặc biệt là: các thuốc giảm đau kháng viêm không steroid khác, warfarin, thuốc lợi tiểu, thuốc tiểu đường, thuốc trị cao huyết áp, thuốc chống đông, lithium, methotrexat, phenytoin,...

SỬ DỤNG QUÁ LIỀU:

Trường hợp quá liều hoặc ngộ độc thuốc cần báo ngay bác sĩ để có biện pháp xử lý thích hợp.

BẢO QUẢN:

Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất

SĐK: VD-22313-15

Sản xuất nhượng quyền của AVENTIS PHARMA S.A.

20 Avenue Raymond Aron, 92160 Antony, France

tại Công ty ROUSSEL VIỆT NAM

Số 1, đường số 3, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương - Việt Nam.

Phân phối bởi:

Công ty Cổ Phần Phân Phối Dược Sài Gòn (SD Pharma)

72 Bạch Đằng, P. 24, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

