



CÔNG THỨC

Cho 1 tuýp 10g.

Thành phần	OXY 5	OXY 10
Benzoyl Peroxide	0,5g	1g
Tá dược:	Vừa đủ	Vừa đủ
Cetyl Alcohol (0,235g), Colloidal Silicon Dioxide (0,18g), Propylene Glycol (0,1g), Glyceryl Stearate (và) PEG-100 Stearate (0,1g), Sodium Lauryl Sulfate (0,05g), Citric Acid (0,05g), Sodium Citrate (0,05g), Methyl Parahydroxybenzoate (0,015g), Propyl Parahydroxybenzoate (0,005g), nước tinh khiết.	10g	10g

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Chỉ sử dụng ngoài da. Lắc kỹ thuốc trước khi dùng.
Rửa thật sạch và lau khô vùng da cần chữa trị. Chấm OXY lotion lên các nốt mụn. Bôi nhẹ nhàng trên vùng da nhờn có mụn ở mặt, cổ hoặc bất kỳ chỗ nào trên cơ thể có mụn trứng cá hoặc mụn bọc.
Bôi thuốc ngày một lần lúc bắt đầu sử dụng, sau đó bôi ngày 2 lần hoặc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.

CHỈ ĐỊNH

Benzoyl Peroxide được dùng tại chỗ để điều trị mụn trứng cá nhẹ hoặc vừa và là thuốc hỗ trợ trong điều trị mụn trứng cá nặng và mụn trứng cá có mủ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Quá mẫn cảm với Benzoyl Peroxide. Tránh không dùng thuốc ở người có da nhạy cảm hoặc đã từng dị ứng với Benzoyl Peroxide.

THẬN TRỌNG

Nên thử trước xem da bạn có nhạy cảm với sản phẩm này không bằng cách bôi thử lên vùng da nhỏ bị mụn. Nếu xuất hiện ngứa hoặc khô da nên giảm số lần sử dụng và xin chỉ dẫn của bác sĩ. Tránh để thuốc chạm vào mắt, môi, miệng. Quần áo màu hoặc nhuộm có thể bị tẩy trắng bởi tác động oxy hóa của Benzoyl Peroxide. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Để thuốc xa tầm tay trẻ em.

Trong và sau khi sử dụng sản phẩm này nếu bị dị ứng thì ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ.



TRIỆU CHỨNG VÀ ĐIỀU TRỊ KHI SỬ DỤNG QUÁ LIỀU

Bôi thuốc quá liều sẽ gây đỏ da tại chỗ quá mức và bong da do tác dụng làm khô da của Benzoyl Peroxide. Các triệu chứng này sẽ giảm khi ngưng bôi thuốc. Khi được chỉ định điều trị để làm giảm triệu chứng, lau nhẹ vùng da tổn thương bằng gạc hoặc băng cuộn có tẩm dầu thực vật.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Thuốc có thể gây kích ứng da, viêm da tiếp xúc, khô da. Hiếm khi gặp hiện tượng ngứa dữ dội, tấy đỏ, nóng rát, sưng phù.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Không dùng thuốc khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc tia tử ngoại. Hỏi ý kiến bác sĩ khi sử dụng các chế phẩm ngoài da khác trên cùng một vùng cần trị liệu.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI

Tuýp 10g/hộp

BẢO QUẢN

Đóng chặt nắp sau khi dùng. Để nơi mát dưới 30°C, tránh ánh nắng trực tiếp.

DẠNG BẢO CHẾ

Lotion bôi da

HẠN SỬ DỤNG

24 tháng kể từ ngày sản xuất.
Không dùng quá hạn sử dụng ghi trên nhãn.

TIÊU CHUẨN

TCCL: TCCS

LƯU Ý

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Sản xuất bởi:

CTY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)

VSIP, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại liên lạc: 08-38229322

Trụ sở chính:



ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
TEGAKI, JAPAN