Hướng dẫn sử dụng thuốc

LONG HUYẾT P/H

Thành phần (cho 1 viên):

Cao khô Huyết giác *(Lignum Dracaenae cambodianae)*.....280mg

(tương đương với 4g dược liệu).

Tá dược *(talc)*.....*vđ 1 viên.*

Dạng bào chế: Viên nang cứng.

Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 12 viên.

Long huyết là phần thân hóa gỗ màu đỏ của cây Dracaenae cambodiane già cỗi, sống hàng trăm năm trên các núi đá. Từ lâu nó đã được biết đến như là vị thuốc quý bí truyền của các võ sư, thầy thuốc dùng đặc trị nội, ngoại thương như: Giảm đau, cầm máu, giúp nhanh liền vết thương do dao kiếm, các chấn thương do va đập mạnh gây bầm dập, tụ máu, sưng đau...

Công dụng Long huyết P/H: Tan bầm tím, giảm đau, mau lành vết thương (tiêu sưng, giảm phù nề).

Chỉ định: Thuốc đông dược Long huyết P/H dùng để điều trị rất hiệu quả các trường hợp:

- Sưng đau, bầm tím, bong gân, chấn thương do va đập, bị đòn, té ngã, tai nạn lao động, giao thông, luyện tập thể thao. Giúp giảm đau và làm tan nhanh các vết bầm tím.
- Vết thương hở ngoài da như: Vết trầy xước, vết cắt sâu do dao kiếm, tai nạn gây ra. Giúp vị trí tổn thương mau khô - tiêu sưng, chống phù nề một cách hiệu quả, nhanh liền sẹo.
- Vết thương do phẫu thuật: Kết hợp sử dụng Long huyết P/H trong quá trình điều trị giúp nhanh phục hồi.
- Trị mụn nhọt, vết loét lâu ngày không khỏi.

Cách dùng & liều dùng: Uống sau bữa ăn từ 1 - 2 giờ.

- Người lớn: Ngày uống 3 lần mỗi lần 4 viên.
- Trẻ em: Uống 1/2 liều của người lớn.

Tác dụng phụ: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ

https://vnras.com/

tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Chống chỉ định: Không dùng cho phụ nữ có thai.

Thận trọng: Thận trọng khi dùng thuốc cho người đang có xuất huyết, đang trong kỳ kinh nguyệt và người bị chứng máu khó đông.

Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc chống chỉ định cho phụ nữ có thai.

Trường hợp phụ nữ cho con bú: Hiện vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Chưa có tài liệu, báo cáo nào của thuốc được ghi nhận.

Quá liều và cách xử trí: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

- **Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
- **Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
- **Tiêu chuẩn:** TCCS.

Thông báo với bác sỹ những tác dụng phụ không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

P/H PHUC HUNG

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Trụ sở: 96 - 98 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội
Nhà máy GMP WHO: CCN Thanh Oai, Thanh Oai, Hà Nội
Tel: 024.3382 6222 * Fax: 024.3397 8024
Website: www.dongduocphuchung.com.vn

GMP GOOD MANUFACTURING PRACTICE QUALITY PRODUCT

HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

Ngôi Sao THUỐC VIỆT

Điện thoại tư vấn 1800 545435

https://vnras.com/