

Medskin Clovir

Acyclovir 5%

CÔNG THỨC:

Acyclovir 250 mg

Tá dược vừa đủ 5 g

(Propylen glycol, natri lauryl sulfat, simulgel 600 PHA (sepineo P600), natri EDTA, menthol, nipagin, nipasol, nước tinh khiết).

DẠNG BẢO CHẾ: Kem bôi da.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 tuýp x 5 g.

TÍNH CHẤT: Acyclovir là chất tương tự như nucleosid, có tác dụng ức chế tổng hợp ADN và sự nhân lên của virus *Herpes* một cách có chọn lọc nên không ảnh hưởng đến chuyển hóa của tế bào bình thường.

Acyclovir có tác dụng mạnh nhất trên tế bào nhiễm virus *Herpes simplex* týp 1 (HSV - 1), và giảm dần trên *Herpes simplex* týp 2 (HSV - 2) và virus *Varicella zoster* (VZV), cytomegalovirus (CMV).

CHỈ ĐỊNH: Điều trị nhiễm trùng *Herpes simplex* trên da bao gồm: mụn rộp sinh dục ban đầu và tái phát; *Herpes labialis*.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG:

Medskin Clovir không khuyến cáo sử dụng trong các trường hợp như trong miệng, mắt hoặc âm đạo, vì có thể gây kích ứng.

Ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch nặng (như bệnh nhân AIDS hoặc người nhận ghép tủy xương) nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng.

Propylen glycol, nipagin và nipasol có thể gây kích ứng da.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Phụ nữ mang thai: Chỉ nên dùng acyclovir cho người mang thai khi lợi ích điều trị hơn hẳn rủi ro có thể xảy ra với bào thai.

Phụ nữ cho con bú: Thuốc không bài tiết qua sữa mẹ nên lượng thuốc vào trẻ bú mẹ không đáng kể.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Không có tương tác có ý nghĩa lâm sàng nào được xác định.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Có thể gặp các biểu hiện như:

	Ít gặp	Hiếm gặp	Rất hiếm gặp
Hệ miễn dịch			Phù mạch, nổi mề đay
Da và mô dưới da	Ngứa, làm khô hoặc tróc da nhẹ	Ban đỏ, viêm da tiếp xúc	

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Không có tác dụng không mong muốn nếu dùng 2 tuýp Medskin Clovir chứa 500 mg acyclovir đã được uống bằng đường uống. Việc uống quá liều acyclovir qua đường uống, trong nhiều ngày sẽ ảnh hưởng đến đường tiêu hóa (buồn nôn và nôn) và thần kinh (nhức đầu và nhầm lẫn).

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Thoa một lớp mỏng lên vị trí tổn thương cách 4 giờ một lần (5 - 6 lần/ ngày), trong 5 đến 7 ngày. Nên bắt đầu điều trị ngay khi xuất hiện các triệu chứng.

Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.