



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Nemydexan

Thuốc nhỏ Mắt - Mũi - Tai

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

THÀNH PHẦN:

Neomycin sulfat.....34.000 IU

Dexamethason natri phosphat..... 10 mg

Tá dược vừa đủ..... 10 ml

Tá dược gồm: Natri clorid, Acid citric, Natri hydroxyd, Thimerosal, Nước cất.

DẠNG BÀO CHẾ: Dung dịch.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Lọ 5 ml, hộp 1 lọ ; Lọ 8 ml, hộp 1 lọ.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC:

Thuốc nhỏ mắt NEMYDEXAN có tác dụng đa năng do tính chất kháng viêm mạnh của dexamethason và tác dụng kháng khuẩn của neomycin. Hệ tá dược sử dụng trong thành phần chế phẩm đảm bảo thuốc dung nạp tốt, không kích ứng niêm mạc mắt. Neomycin có tác dụng trên vi khuẩn gram (-) và một số vi khuẩn gram (+).

Dexamethason ngăn ngừa quá trình viêm đi kèm với nhiễm trùng trên niêm mạc mắt.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Thuốc nhỏ mắt có tác dụng tại chỗ. Riêng dexamethason được hấp thu tốt tại chỗ, sau đó phân bố vào các mô trong cơ thể. Nửa đời sinh học của dexamethason trong khoảng 36 - 54 giờ.

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị viêm nhiễm mắt, mũi, tai như viêm kết mạc, giác mạc, củng mạc, mống mắt, tuyến lệ, viêm mũi, viêm tai ngoài.

Dùng trong chấn thương mắt, chống nhiễm trùng trước và sau phẫu thuật mắt.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Loét giác mạc.



Những trường hợp mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

Người có tiền sử glaucom, nấm mắt, lao mắt.

Không dùng thuốc trong thời gian dài.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Thuốc dùng ngoài với liều rất nhỏ, tác dụng tại chỗ nên ít có nguy cơ gây ảnh hưởng đến phụ nữ có thai và cho con bú.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Khi dùng dài ngày, dexamethason có thể hấp thu làm tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể.

Ghi chú: *“Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc”.*

THẬN TRỌNG:

Không dùng thuốc liên tục trong thời gian dài. Cần theo dõi nhãn áp và thủy tinh thể khi cần sử dụng kéo dài.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Thuốc nhỏ mắt có tác dụng tại chỗ nên không có tương tác với các thuốc dùng theo đường khác.

LIỀU DÙNG: Mỗi lần 1 - 2 giọt, 3-4 lần/ngày hoặc theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

CÁCH DÙNG: Cầm lọ thuốc dốc ngược, hướng đầu lọ vào mắt, bóp nhẹ cho thuốc nhỏ vào mắt.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:

Quá liều glucocorticoid gây ngộ độc cấp hoặc gây chết rất hiếm. Không có thuốc giải độc đặc hiệu. Không có chỉ định cho việc điều trị ngộ độc mạn, trừ trường hợp người bệnh quá nhạy cảm với corticosteroid, gây bệnh lý, lúc đó cần điều trị các triệu chứng. Choáng phản vệ hoặc phản ứng quá mẫn có thể được điều trị bằng epinephrine, hô hấp nhân tạo và aminophylin. Người bệnh nên được giữ ấm và yên tĩnh.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Nếu thấy thuốc vẫn đục, biến màu hoặc thấy hiện tượng khác lạ thì báo cho nhà sản xuất biết.

Không dùng thuốc quá 15 ngày sau khi mở nắp lần đầu tiên.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS

Nhà sản xuất



NAMHA PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

415 Hàn Thuyên - Nam Định

Tel: 0228.3649408 - Fax: 0228.3644650.

Website: <http://www.namhapharma.com>