

XIN ĐỌC KÝ ĐƠN NÀY TRƯỚC KHI DÙNG. GIỮ ĐƠN ĐỂ TRA CỨU KHI CẦN

THUỐC DÙNG NGOÀI

MENTHOLATUM
Remos
ANTI-ITCH THUỐC CHỐNG NGỨA



MENTHOLATUM

► Ngứa là triệu chứng thường gặp, do nhiều nguyên nhân khác nhau như: dị ứng, viêm da, phát ban, chàm, nổi mề đay, côn trùng cắn, lở loét, rôm sảy,... hoặc do các bệnh bên trong cơ thể. Ngứa gây cảm giác bức rứt khó chịu, mất ngủ, ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày. Gãi làm giảm cảm giác ngứa tạm thời nhưng có thể làm da trầy xước, dẫn đến viêm da thứ phát.

► Remos Anti-Itch giảm các triệu chứng ngứa. Công thức phối hợp các hoạt chất chống ngứa, kháng viêm, kháng khuẩn và phục hồi da, giúp điều trị ngứa do dị ứng, rôm sảy, chàm, mề đay, côn trùng cắn.

► Remos Anti-Itch dạng gel trong nhanh chóng thẩm vào da.

THÀNH PHẦN

Hoạt chất: (hàm lượng trong 10g)

Lidocaine	200 mg
Diphenhydramine	100 mg
Dipotassium Glycyrrhizinate	100 mg
Tocopherol Acetate	50 mg
Isopropylmethylphenol	10 mg

Tá dược: dl-Camphor, Polyoxyethylene Hydrogenated Castor Oil 40, 1,3-Butylene Glycol, Carboxyvinyl Polymer, Sodium Hyaluronate, Methylparaben, Butylparaben, Nước tinh khiết.

ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ


Hoạt chất	Tác dụng
Lidocaine	Gây tê tại chỗ, giảm triệu chứng ngứa.
Diphenhydramine	Kháng dị ứng.
Dipotassium Glycyrrhizinate	Chống viêm, giảm đỏ sưng tấy.
Isopropylmethylphenol	Diệt khuẩn, sát trùng, ngăn sự phát triển của vi khuẩn.
Tocopherol Acetate	Kích thích sự phát triển của tế bào, tái tạo da.

► **Khắc phục**
tình trạng
► ngứa, sưng đỏ, viêm da.
►


► **Ngứa**
nhiễm trùng.
► **Phục hồi da.**

CHỈ ĐỊNH

Ngứa, vết côn trùng cắn, chàm, viêm da do tiếp xúc, viêm da dị ứng, mề đay, nổi ban, rôm sảy.


DỊ ỨNG


RÔM SÂY


VẾT CÔN TRÙNG CẮN

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng cho người quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
Không sử dụng chế phẩm lên vùng da quanh mắt, niêm mạc và vết thương hở.

LIỀU DÙNG & CÁCH DÙNG

Thoa một lượng gel vừa đủ lên vùng da cần trị liệu, vài lần trong ngày.

LƯU Ý KHI DÙNG THUỐC

1. Hỏi ý kiến bác sĩ hay dược sĩ trước khi dùng trong các trường hợp sau:

- ▶ Đang theo một quá trình điều trị.
- ▶ Gia đình hay bản thân có tiền căn dị ứng với các thành phần của thuốc.
- ▶ Người có tiền sử dị ứng do thuốc.
- ▶ Phụ nữ có thai hoặc cho con bú.
- ▶ Người đỗ nhiều mồ hôi hoặc bị mưng mủ, sưng, viêm, chàm nặng.

2. Trước khi dùng thuốc, chú ý:

- ▶ Trẻ em hay nhũ nhi dùng thuốc theo sự hướng dẫn của người lớn.
- ▶ Chỉ dùng ngoài da. Không thoa lên vùng mắt, niêm mạc, vết thương hở. Nếu sản phẩm dây vào mắt hay vùng niêm mạc, nhanh chóng rửa sạch bằng nước hay nước ấm.
- ▶ Không dùng thuốc đã quá hạn (được ghi trên bao bì).

3. Ngưng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trong các trường hợp sau:

- ▶ Thuốc gây ngứa, phát ban, sưng, đỏ da.
- ▶ Tình trạng không cải thiện sau 5-6 ngày dùng thuốc.

4. Lưu ý khi bảo quản:

- ▶ Vặn chặt nắp sau khi dùng.
- ▶ Bảo quản nơi khô mát (dưới 30 °C), tránh ánh nắng trực tiếp.
- ▶ Không chuyển sản phẩm sang vật chứa khác (diều này có thể gây ra việc sử dụng sai và giảm chất lượng sản phẩm).

5. Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Khi dùng quá liều có thể gây rất ngứa, phát ban, đỏ da. Nếu xảy ra, ngưng dùng thuốc và xin hướng dẫn của bác sĩ hay dược sĩ.

TUONG TÁC THUỐC

Không sử dụng các chế phẩm ngoài da khác trên cùng một vùng cần trị liệu. Hỏi ý kiến bác sĩ hay dược sĩ trước khi sử dụng các chế phẩm khác trong cùng thời gian trị liệu.

TÁC DUNG NGOẠI Ý

Thuốc có thể gây ngứa, sưng, phát ban, đỏ da. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 1 tuýp 10 g.

TCCL: TCCS

DẠNG BÀO CHẾ

Gel thoa da.

- Để xa tầm tay trẻ em. Không dùng thuốc quá hạn sử dụng
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Sản xuất bởi: **CTY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)**

Số 16 VSIP, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore,
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Trụ sở chính: **ROHTO PHARMACEUTICAL CO. LTD.**

OSAKA, JAPAN

