

184/1142

* Nhãn trên hộp 2 vỉ x 5 viên:

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 19/9/2014

BÉ XÀ TẮM TAY TRẺ EM.
 ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
 ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:
 Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
 Số đăng ký (Reg. No.):

Họ và tên (Tên):
 Số và tên (Số và tên):
 (Tên):



8 935206 008562



ROVAS 3M
Spiramycin 3.000.000 IU

DHG PHARMA

Box of 2 blisters x 5 film-coated tablets

Spiramycin 3.000.000 IU

ROVAS 3M

Rx FOR PRESCRIPTION ONLY GMP - WHO



CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
 MỘT THÀNH VIÊN
 DƯỢC PHẨM
 DHG
 HẬU THÀNH A.T. HẬU GIANG

Thành phần:
 Spiramycin 3.000.000 IU
 Tá dược vừa đủ 1 viên
**Chỉ định - Chống chỉ định -
 Liều dùng và cách dùng:**
 Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Tư Vấn Khách Hàng
 **0710.3899000**
www.dhgpharma.com.vn

Sản xuất tại:
CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG
 Khu công nghiệp Tân Phú Thành, Châu Thành A, Hậu Giang
 ĐT: (0711) 3953555 • Fax: (0711) 3953555

Rx THUỐC BÁN THEO ĐƠN

ROVAS 3M

Spiramycin 3.000.000 IU

Hộp 2 vỉ x 5 viên nén bao phim

DHG PHARMA

ROVAS 3M
Spiramycin 3.000.000 IU

* Nhãn trên vỉ 5 viên:

184/2142



 ROVAS 3M Spiramycin 3.000.000 IU Sản xuất tại: Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG	 ROVAS 3M Spiramycin 3.000.000 DHG PHARMA	
 ROVAS 3M Spiramycin 3.000.000 IU Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG	 ROVAS 3M Spiramycin 3.000.000 IU DHG PHARMA	 ROVAS 3M Spiramycin 3.000.000 IU Sản xuất tại: Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

HD: _____
Số lô SX: _____

[Handwritten signature]



MẪU NHÃN SỬA THEO GÓP Ý

* Tờ hướng dẫn sử dụng:



CÔNG THỨC:

Spiramycin 3.000.000 IU

Tá dược vừa đủ 1 viên

(Aerosil, tinh bột sắn, talc, magnesi stearat, sodium starch glycolat, HPMC, PEG 6000, titan dioxyd)

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nén bao phim.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 2 vỉ x 5 viên.

ĐƯỢC LỰC HỌC: Rovas với thành phần hoạt chất chính là spiramycin, kháng sinh nhóm macrolid. Ở các nồng độ trong huyết thanh, thuốc có tác dụng kìm khuẩn nhưng khi đạt nồng độ ở mô thuốc có thể diệt khuẩn. Cơ chế tác động của spiramycin là tác dụng lên các tiểu đơn vị 50S của ribosom vi khuẩn và ngăn cản vi khuẩn tổng hợp protein.

Spiramycin có tác dụng kháng các chủng Gram dương, các chủng *Coccus* như *Staphylococcus*, *Pneumococcus*, *Meningococcus* ...

ĐƯỢC ĐỘNG HỌC: Spiramycin được hấp thu không hoàn toàn ở đường tiêu hóa. Thuốc uống được hấp thu khoảng 20 - 50% liều sử dụng. Nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được trong vòng 2 - 4 giờ sau khi uống. Nồng độ đỉnh trong máu sau liều đơn có thể duy trì được 4 đến 6 giờ. Uống spiramycin khi có thức ăn trong dạ dày làm giảm nhiều đến sinh khả dụng của thuốc. Thức ăn làm giảm khoảng 70% nồng độ tối đa của thuốc trong huyết thanh và làm cho thời gian đạt đỉnh chậm 2 giờ. Spiramycin phân bố rộng khắp cơ thể. Thuốc đạt nồng độ cao trong phổi, amidan, phế quản và các xoang. Spiramycin ít thấm nhập vào dịch não tủy. Thời gian bán thải trung bình là 5 - 8 giờ. Thuốc thải trừ chủ yếu ở mật. Sau 36 giờ chỉ có khoảng 2% tổng liều uống tìm thấy trong nước tiểu.

CHỈ ĐỊNH: Spiramycin được coi là thuốc lựa chọn thứ hai để điều trị những trường hợp nhiễm khuẩn ở đường hô hấp, da, và sinh dục do các vi khuẩn nhạy cảm với thuốc.

Điều trị dự phòng viêm màng não do *Meningococcus*, khi có chống chỉ định với rifampicin.

Dự phòng chứng nhiễm *Toxoplasma* bẩm sinh trong thời kỳ mang thai.

Phòng ngừa viêm thấp khớp cấp tái phát ở người bệnh dị ứng với penicilin.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Người có tiền sử quá mẫn với spiramycin, erythromycin.

THẬN TRỌNG: Thận trọng khi dùng cho bệnh nhân rối loạn chức năng gan, vì thuốc có thể gây độc gan.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Spiramycin đi qua nhau thai, nhưng nồng độ thuốc trong máu thai nhi thấp hơn trong máu người mẹ.

Spiramycin không gây tai biến khi dùng cho người mang thai.

Spiramycin bài tiết qua sữa mẹ với nồng độ cao. Nên ngừng cho con bú khi đang dùng thuốc.

LÀI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Hiếm khi có tác động ảnh hưởng tới khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Dùng spiramycin đồng thời với thuốc uống ngừa thai làm mất tác dụng phòng ngừa thụ thai.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Thường gặp: Buồn nôn, nôn, tiêu chảy, khó tiêu (khi dùng đường uống).

Ít gặp: Toàn thân: Mệt mỏi, chảy máu cam, đổ mồ hôi, cảm giác đè ép ngực; Dị cảm tạm thời, loạn cảm, ảo giác, đau, cứng cơ và khớp nối, cảm giác nóng rát, nóng đỏ bừng (khi tiêm tĩnh mạch); Tiêu hóa: Viêm kết tràng cấp; Da: Ban da, ngoại ban, mày đay.

Hiếm gặp: Phản ứng phản vệ, bội nhiễm do dùng dài ngày thuốc uống spiramycin.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Chưa tìm thấy tài liệu. Trong trường hợp dùng quá liều đã chỉ định nên thông báo ngay cho bác sĩ.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Liều điều trị:

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 3.000.000 IU, 3 lần trong 24 giờ (1 viên x 3 lần/ ngày).

Điều trị dự phòng viêm màng não do các chủng *Meningococcus*:

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 3.000.000 IU, cách 12 giờ uống một lần (1 viên x 2 lần/ ngày).

Dự phòng nhiễm *Toxoplasma* bẩm sinh trong thời kỳ mang thai:

Uống 9.000.000 IU/ ngày (3 viên/ ngày), chia làm nhiều lần, uống trong 3 tuần, cứ cách 2 tuần cho liều nhắc lại.

Dùng phối hợp hoặc xen kẽ với phác đồ điều trị pyrimethamin/ sulfonamid có thể đạt kết quả tốt hơn.

Thức ăn trong dạ dày làm giảm sinh khả dụng của spiramycin, nên cần cho uống thuốc trước bữa ăn ít nhất 2 giờ hoặc sau bữa ăn 3 giờ.

Người bệnh dùng spiramycin phải theo hết đợt điều trị.

Hoặc theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS.

HỒ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hưng

Sản xuất tại:
CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG
Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
ĐT: (0711) 3953555 • Fax: (0711) 3953555

Tư Vấn Khách Hàng
0710.3899000
E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com.vn
www.dhgpharma.com.vn