

2.4 - Hộp 6 vỉ: Tỷ lệ 2/3



Rx **PAROCONTIN**

Viên nén bao phim

1. Thành phần: Công thức cho 1 viên nén bao phim:

Paracetamol

325 mg

Methocarbamol

400 mg

Tá dược: Lactose, Microcrystalline cellulose, Crosscarmellose, Povidone, Talc, Magnesium stearate, Hydroxypropyl methyl cellulose, Macrogol 6000, Titan dioxyd, Ethanol 96°, Nước tinh khiết

vừa đủ

1 viên.

2. Chỉ định:

Giảm đau trong các trường hợp đau có liên quan đến co thắt cơ - xương như:

- Đau cấp tính và mãn tính do căng cơ, bong gân, hội chứng whiplash, chấn thương, viêm cơ.
- Đau và co thắt liên quan đến viêm khớp, vẹo cổ, căng và bong gân khớp, viêm túi chất nhón bursa, đau lưng dưới có nguyên nhân rõ ràng.

3. Chống chỉ định:

Bệnh nhân quá mẫn với Methocarbamol, Paracetamol hay bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Người bệnh nhiều lần thiếu máu hoặc có bệnh tim, phổi, thận hoặc gan.

Người bệnh thiếu hụt glucose - 6 - phosphat dehydro - genase.

Bệnh nhân hôn mê, giai đoạn tiến hồn mê, tổn thương não, nhược cơ, tiền sử động kinh.

4. Thận trọng và cảnh báo đặc biệt khi sử dụng thuốc:

Không nên dùng trong trường hợp lái xe, vận hành máy móc, hoặc trẻ em dưới 12 tuổi.

Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Steven-Johnson (SJS), hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, hội chứng ngoại ban mụn mù toàn thân cấp tính (AGEP).

5. Tương tác thuốc:

Không nên kết hợp Methocarbamol với rượu, thức uống chứa cồn, thuốc ức chế thần kinh trung ương khác.

Methocarbamol có thể gây ra một trạng thái ăn, nhức cơ, ức chế tác dụng các Pyridostigmine.

Không nên phối hợp với thuốc có tác dụng ức chế thần kinh trung ương khác, thuốc chống co giật (Phenytoin, Barbiturat, Carbamazepin), Isoniazid, thuốc ngủ, thuốc kháng Histamin, thuốc ức chế thần kinh cơ khác, uống rượu quá nhiều.

6. Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Không nên sử dụng cho phụ nữ mang thai, cho con bú do chưa xác định được tính an toàn của thuốc trong thời gian mang thai, và chưa biết rõ Methocarbamol có trong sữa mẹ hay không.

7. Tác dụng không mong muốn:

Thường xảy ra: buồn nôn, nôn, biếng ăn, chóng mặt, mệt mỏi, buồn ngủ, bồn chồn, lo âu, run, hoa mắt, sốt, đau đầu, co giật.

Hiếm khi xảy ra: ngứa, phát ban trên da, nổi mày đay, phù mạch, viêm kết mạc, sung huyết mũi, mất bạch cầu hạt, bệnh thiếu máu tan huyết.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gấp phải khi sử dụng thuốc.

8. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:


Bệnh nhân cần được cảnh báo Methocarbamol có thể làm giảm khả năng tập trung đối với những công việc đòi hỏi sự tỉnh táo về tinh thần hay khỏe mạnh về thể chất như vận hành máy móc hoặc lái xe.

9. Cách dùng và liều lượng: Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ.

Người lớn: uống 1 - 2 viên/lần x 4 lần/ngày, cách 6 giờ uống 1 lần.

Liều khuyến nghị đối với Methocarbamol từ 3,2 g - 4,8 g/ngày, Paracetamol: 2,6 g - 3,9 g/ngày.

Uống thuốc sau khi ăn.



10. Quá liều và xử trí:

Chưa tìm thấy thông tin về độc tính cấp của Methocarbamol, quá liều Methocarbamol xảy ra khi dùng chung với rượu hay thuốc ức chế thần kinh trung ương khác với các triệu chứng như: buồn nôn, buồn ngủ, huyết áp thấp.

Quá liều Paracetamol có thể do dùng một liều rất lớn Paracetamol (7,5 – 10g mỗi ngày, trong 1 – 2 ngày hoặc uống thuốc dài ngày) có thể gây hoại tử gan phì đại, buồn nôn, nôn, và đau bụng, Methemoglobin – máu, dẫn đến chứng xanh tím da, niêm mạc và móng tay, có thể có kích thích/ức chế hệ thần kinh trung ương, suy thận cấp.

Trường hợp quá liều Methocarbamol, Paracetamol phải rửa dạ dày trong mọi trường hợp, và điều trị bằng các phương pháp hỗ trợ cần thiết.

Liệu pháp giải độc Paracetamol chính là dùng những hợp chất Sulphydryl, N – acetylcysteine.

Nếu không, có thể dùng Methionin, than hoạt và/hoặc thuốc tẩy muối.

11. Các đặc tính dược lực học:

Paracetamol là thuốc giảm đau trong điều trị chứng đau nhẹ và vừa, hiệu quả nhất là làm giảm đau cơn đau có nguồn gốc không phải nội tạng. Với liều điều trị Paracetamol ít tác động đến hệ tim mạch và hô hấp, không làm thay đổi cân bằng acid – base, không gây kích ứng, xước hoặc chảy máu dạ dày, không có tác dụng trên tiểu cầu hoặc thời gian chảy máu. Methocarbamol là thuốc ức chế hệ thần kinh trung ương với đặc tính làm dịu thần kinh và giãn cơ – xương. Cơ chế tác dụng của Methocarbamol chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, Methocarbamol không làm giảm dẫn truyền thần kinh, thần kinh cơ, kích thích cơ như các chất ức chế thần kinh cơ khác.

iệu ứng với sự kết hợp giữa Methocarbamol và Paracetamol nên có tác dụng ức chế thần kinh dẫn truyền cảm giác đau hoặc ức chế dẫn truyền cảm giác đau đến não trong các trường hợp đau liên quan đến co thắt cơ – xương.

12. Các đặc tính dược động học:

Paracetamol được hấp thu nhanh chóng và hầu như hoàn toàn qua đường tiêu hóa. Đạt nồng độ đỉnh trong huyết tương trong vòng 30 – 60 phút sau khi uống với liều điều trị.

Paracetamol phân bố nhanh và đồng đều trong phần lớn các mô của cơ thể. Khoảng 25% Paracetamol trong máu kết hợp với protein huyết tương. Thời gian bán thải của Paracetamol là 1,25 – 3 giờ, thải trừ chủ yếu qua nước tiểu.

Methocarbamol được hấp thu nhanh chóng và gần như hoàn toàn ở đường tiêu hóa. Khoảng 46 – 50% Methocarbamol gắn kết với protein huyết tương, thời gian bán thải từ 1 – 2 giờ.

Methocarbamol được đào thải hoàn toàn qua nước tiểu dưới dạng liên hợp, và một lượng nhỏ dưới dạng không chuyển hóa.

13. Quý cách đóng gói: Hộp 03 vỉ x 10 viên nén bao phim.

Hộp 06 vỉ x 10 viên nén bao phim.

Hộp 01 chai x 30 viên nén bao phim.

Hộp 01 chai x 60 viên nén bao phim.

14. Điều kiện bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

15. Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

16. Lời khuyến cáo: Thuốc bán theo đơn.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến Bác sĩ.

Không dùng thuốc khi đã quá hạn dùng ghi trên nhãn.

THUỐC ĐẠT TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

15 Đốc Bình Kiều, Phường 2, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

ĐT: 0273.3871.817

Fax: 0273.3883.740



TIPHARCO