

# SÁNG MẮT

VIỆN NANG MỀM SÁNG MẮT

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Y học cổ truyền phương Đông quan niệm "con mắt" phản ánh "thần", biểu hiện tình trạng sức khỏe. Khí của can được biểu hiện ra ở mắt. Khí của can tốt thì thị lực tốt, ngược lại thì mắt mờ, thị lực suy giảm. "Tinh hoa của tạng phủ và 12 kinh mạch đều dồn lên mắt, can là nơi tàng huyết, ban ngày lao động thì huyết lưu hành ở các đường kinh, cho nên mắt nhờ huyết nuôi dưỡng thì mới có thể nhìn rõ mọi vật" - Theo sách "HOÀNG ĐẾ NỘI KINH TỐ VẤN", muốn sáng mắt, tăng thị lực thì dùng thuốc có tác dụng tư bổ can thận, bổ huyết. Sản phẩm "SÁNG MẮT" của Traphaco xuất xứ từ bài thuốc cổ phương "KỶ CÚC ĐỊA HOÀNG HOÀN" được sản xuất với các dạng bào chế: viên nang mềm, viên nang cứng và viên hoàn cứng.

Các vị thuốc trong bài thuốc có nguồn gốc cây cỏ vừa có tác dụng bổ huyết, bổ can thận âm vừa có tác dụng thanh can giáng hỏa: âm huyết đầy đủ thì hỏa tự lui mà sáng mắt ra; can hỏa vượng gây đau đầu choáng váng, mắt nóng đỏ, sung huyết thì phải dùng thanh can giáng hỏa. Bởi vậy bài thuốc phối hợp vừa trị triệu chứng lại vừa trị nguyên nhân gây bệnh.

**QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:** Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên.

**DẠNG BÀO CHẾ:** Viên nang mềm.

Mô tả: Viên nang mềm màu xanh, hình thuôn dài.

**THÀNH PHẦN:** Mỗi viên chứa:

**Thành phần hoạt chất:**

Cao khô hỗn hợp dược liệu.....235 mg

Tương đương 1418 mg dược liệu:

- Trạch tả (*Rhizoma Alismatis*).....206 mg
- Thực địa (*Radix Rehmanniae glutinosae praeparata*).....206 mg
- Thảo quyết minh (*Semen Sennae torae*).....286 mg
- Hoài sơn (*Tuber Dioscoreae persimilis*).....247 mg
- Hạ khô thảo (*Spica Prunellae*).....50 mg
- Hà thủ ô đỏ (*Radix Fallopiae multiflorae*).....221 mg
- Cúc hoa vàng (*Flos Chrysanthemi indicii*).....112 mg
- Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*).....90 mg

Bột dương quy (*Pulvis Radix Angelicae sinensis*).....70 mg

**Thành phần tá dược:** Lecithin, Sáp ong trắng, Palm oil, Colloidal silicon dioxid, Dầu đậu nành, Gelatin, Kẽm sulfat, Glycerin, Sorbitol, Methylparaben, Propylparaben, Ethyl vanillin, Riboflavin, Patent blue, Quinoline yellow, Brown HT, Titan dioxyd, Nước tinh khiết.....vừa đủ

### CHỈ ĐỊNH:

- Dự phòng và điều trị các bệnh về mắt do can thận âm hư, huyết hư như:
  - + Mờ mắt, nhức mắt, khô mắt, chói mắt khi ra nắng.
  - + Các trường hợp mắt đỏ nóng, xung huyết.
  - + Thị lực giảm.
  - + Đau đầu chóng mặt, nóng đỉnh đầu, ban chồn, dị ứng, mẫn ngứa (đặc biệt vùng đầu mắt).
- Hỗ trợ điều trị viêm võng mạc và viêm tuyến lệ.

### LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- Người lớn: uống 2 - 3 viên/lần x 3 lần/ngày.
  - Trẻ em: uống 1 viên/lần x 3 lần/ngày.
- Thời gian sử dụng 4 - 6 tuần hoặc lâu hơn tùy tình trạng bệnh.

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

### CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG:

- Sản phẩm chứa:
  - Dầu đậu nành: không nên sử dụng nếu bị dị ứng với lạc hoặc đậu nành.
  - Sorbitol: nên liên hệ bác sĩ trước khi dùng thuốc nếu mắc chứng không dung nạp đường.
  - Methylparaben, propylparaben: có thể gây phản ứng dị ứng (có thể là dị ứng muện).

### SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

### ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Không ảnh hưởng.

### TƯƠNG TÁC THUỐC:

Chưa có dữ liệu về tương tác thuốc.

### TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.  
Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

### QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc. Trường hợp sử dụng thuốc quá liều, cần tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

**ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

**HẠN DÙNG:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

**TIÊU CHUẨN:** TCCS.