


587/161

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ
VIÊN NÉN DÀI TAMGEZYL

1. Mẫu nhãn vỉ



2. Mẫu nhãn hộp 2 vỉ

<p>Ta dược vừa đủ 1 viên nên N-Acetyl dl-Leucin...500mg CỘNG THỨC: Mỗi viên chứa</p> <p>Sản xuất tại 60 Độc Lập Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore Thị xã Thuận An - Tỉnh Bình Dương</p>	
<h1>Tamgezyl 500mg</h1> <p>N-Acetyl dl-Leucin 500mg</p> <p>Hộp 2 vỉ x 10 viên nén dài</p>	
<p>CHI NHÁNH CTY TNHH SX-TM DƯỢC PHẨM THÀNH NAM 60 Độc Lập, KCN Việt Nam Singapore, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương</p> <p>Tpharco., Ltd</p>	
<p>BẢO QUẢN NƠI KHÔ MÁT, TRÁNH ÁNH SÁNG, NHIỆT ĐỘ DƯỚI 30°C ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TIÊU CHUẨN CƠ SỞ</p>	
<p>Tamgezyl 500mg N-Acetyl dl-Leucin 500mg</p>	<p>Tamgezyl 500mg</p> <p>Hoạt chất: N-Acetyl dl-Leucin 500 mg</p> <p>SĐK/Reg.No.:</p> <p>Số lô SX/Batch No.:</p> <p>Ngày SX/MFD:</p> <p>Hạn dùng/EXP:</p>

Bình Dương, ngày 25 tháng 11 năm 2017
CÔNG TY TNHH SX -TM DP THÀNH NAM


KT/ Giám đốc
Phó giám đốc



Ds Nguyễn Quốc Chinh

Handwritten text in the top right corner, possibly a date or reference number.

Handwritten text in the middle right section, possibly a name or title.



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Viên nén dài TAMGEZYL

THÀNH PHẦN : Mỗi viên nén chứa

N-acetyl-dl -leucin 500 mg

Tá dược vừa đủ 1 viên

(Avicel PH101, Era-pac, PVP. K30, Talc, Magnesi stearat).

ĐƯỢC LỰC HỌC

Acetylleucin thuộc nhóm dược lý: chống chóng mặt. Mã ATC: N07CA04

Thuốc chống chóng mặt chưa rõ cơ chế.

ĐƯỢC ĐỘNG HỌC

Đạt được nồng độ đỉnh của acetylleucin trong huyết tương khoảng 2 giờ sau khi uống.

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ

Điều trị triệu chứng các cơn chóng mặt.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Người lớn: 1,5 – 2 g/ngày (3 – 4 viên/ngày), chia làm 2 lần, sáng và tối.

Thời gian điều trị thay đổi theo diễn tiến lâm sàng (từ 10 ngày đến 5 - 6 tuần); lúc bắt đầu điều trị hoặc nếu điều trị không đạt hiệu quả có thể tăng liều lên 3 g và ngay cả 4 g/ngày (6 – 8 viên/ngày).

Cách dùng: Dùng theo đường uống.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Quá mẫn với acetylleucin hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG

Không có dữ liệu.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC

Không có dữ liệu.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Dựa vào những dữ liệu có sẵn, cần thận không nên dùng acetylleucin khi mang thai dù ở giai đoạn nào.

Không có dữ liệu có sẵn, không nên sử dụng acetylleucin khi cho con bú.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không có dữ liệu.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Rất hiếm gặp: Nổi ban (có thể kèm theo ngứa), nổi mề đay.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ

Không có dữ liệu.

BẢO QUẢN : Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

HẠN DÙNG : 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN : TCCS

TRÌNH BÀY : Hộp: 2 vỉ x 10 viên

KHUYẾN CÁO : **Để xa tầm tay của trẻ em**

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng


Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX – TM DƯỢC PHẨM THÀNH NAM

Địa chỉ: 60 Đại lộ Độc lập, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương

Văn phòng: 3A Đặng Tất, P. Tân Định, Quận 1, Tp. HCM

Tp. HCM, ngày 25 tháng 11 năm 2017



TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh



KT/ Giám đốc
Phó Giám đốc
DS NGUYỄN QUỐC CHINH

•••••
•••••

1/1/20

