

Rx

Thuốc bán theo đơn

TETRACYCLIN 1%

Thuốc mỡ tra mắt



THÀNH PHẦN: Mỗi tuýp 5g chứa:

+ **Hoạt chất chính:** Tetracyclin hydrochlorid...50mg

+ **Tá dược:** Vaseline, lanolin, sáp ong trắng.

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị nhiễm khuẩn ở mắt do vi khuẩn nhạy cảm với tetracyclin: viêm kết mạc và giác mạc do nhiễm trùng, loét giác mạc có bội nhiễm, viêm mí mắt, lẹo.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Dị ứng với bất cứ thành phần nào của thuốc.

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:

Tra mắt 3 - 6 lần trong 24 giờ.

Chú ý:

Bóp 1 lượng nhỏ thuốc đặt vào mí mắt dưới của mắt nhiễm khuẩn.

Tránh làm nhiễm bẩn đầu của tuýp thuốc khi tra mắt.

Thuốc này có thể dùng một mình hoặc phối hợp trong điều trị toàn thân.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Có thể có phản ứng dị ứng, ngứa, nổi mề đay, xung huyết.

Ghi chú: Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THẬN TRỌNG:

- Như với các kháng sinh khác: sử dụng lâu dài có thể gây ra tình trạng bộc phát các vi khuẩn không nhạy cảm, kể cả vi nấm. Nếu có bội nhiễm nên ngừng thuốc và áp dụng biện pháp trị liệu thích hợp.
- Thận trọng khi sử dụng ở phụ nữ có thai và cho con bú.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Ở một vài bệnh nhân, có thể xảy ra viêm ở mắt khi dùng chung với các thuốc về mắt có chứa chất bảo quản Thimerosal.

DƯỢC LỰC HỌC:

- Tetracyclin là một kháng sinh phổ rộng có tác dụng kìm khuẩn do tác dụng ức chế quá trình tổng hợp protein của vi khuẩn.
- Cơ chế tác dụng của tetracyclin là do khả năng gắn vào và ức chế chức năng ribosom của vi khuẩn, đặc biệt là gắn vào đơn vị 30S của ribosom. Do vậy, tetracyclin ngăn cản quá trình gắn aminoacyl t - RNA dẫn đến ức chế quá trình tổng hợp protein.
- Khi vi khuẩn kháng tetracyclin, vị trí gắn tetracyclin trên ribosom bị biến đổi. Vì vậy tetracyclin không gắn vào ribosom của vi khuẩn và mất tác dụng.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Thuốc mỡ mắt tetracyclin có giới hạn tác dụng trị liệu tại chỗ do nhiễm khuẩn ở cấu trúc bên ngoài mắt và các phần phụ do các chủng vi khuẩn nhạy cảm với tetracyclin.

QUÁ LIỀU - XỬ TRÍ:

Báo ngay cho bác sĩ khi dùng quá liều chỉ định.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Tuýp 5g - Hộp 1 tuýp.

BẢO QUẢN: Để nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: DĐVN IV

CHÚ Ý: THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SỸ

Không sử dụng thuốc nếu:

* **Thuốc bị biến màu, biến dạng.**

* **Tuýp bị nứt, thủng hay rò rỉ.**

- Phải ngưng dùng thuốc ngay và thông báo cho bác sĩ khi gặp những triệu chứng dị ứng.

- Để xa tầm tay trẻ em.

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

- Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên nhãn.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM T.U VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

ĐT: (08)-38440106

Fax: (84-8)-38440446

Sản xuất tại chi nhánh

CÔNG TY CPDP T.U VIDIPHA TỈNH BÌNH DƯƠNG

Ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương