

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG****Rx THIÊN SỨ HỘ TÂM ĐAN***(Angel Cardiotonic pill)***DƯỢC LỰC HỌC**

1. **Thiên Sứ Hộ Tâm Đan** có tác dụng làm giãn động mạch vành tim, tăng lưu lượng máu đến động mạch vành, cải thiện lưu lượng tim, có hiệu quả giảm kết tập tiểu cầu, phòng chống huyết khối.
2. **Thiên Sứ Hộ Tâm Đan** có hiệu quả điều trị trong hội chứng như chứng thiếu máu cục bộ gây ra bởi chứng xơ cứng động mạch, hội chứng não ở tuổi già nhờ tăng lưu lượng máu đến não, cải thiện rối loạn tuần hoàn não, phòng ngừa và điều trị các bệnh về mạch máu.
3. **Thiên Sứ Hộ Tâm Đan** có hiệu quả trong điều trị bệnh tăng mỡ máu, xơ cứng động mạch và chứng thiếu máu cục bộ tim nhờ cải thiện tuần hoàn vi mạch, ngăn cản quá trình peroxide hoá lipid, tăng cường hoạt động của SOD (superoxide dismutase), giảm độ nhớt của máu toàn phần và huyết tương, giảm Cholesterol.
4. **Thiên Sứ Hộ Tâm Đan** làm giãn động mạch vành, giãn cơ trơn mạch máu, tránh nghẽn máu cục bộ cơ tim, giảm kết tập tiểu cầu, phòng chống huyết khối.

**THÀNH PHẦN:** Mỗi viên hoàn giọt bao gồm:

Cao dược liệu (Cao đặc): 6,25mg

(tương đương với 43,56mg Đan sâm - *Radix Salviae Miltiorrhizae*  
và 8,52mg Tam thất - *Radix Notoginseng*)

Borneol : 1,0mg

**TÁ DƯỢC:** Macrogol 6000, chất bao film.**DẠNG BÀO CHẾ:** Viên hoàn giọt**TÁC DỤNG VÀ CHỈ ĐỊNH:**

- Thông thoáng huyết quản động mạch, giảm thiếu Cholesterol, chống tích tụ chất thải trong máu, làm chậm sự tiến triển của quá trình xơ vữa động mạch vành
- Thuốc được dùng để điều trị và phòng ngừa các chứng rối loạn nhịp tim, đau thắt ngực và thừa Cholesterol.

**CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:**

Thuốc dùng uống hoặc ngậm dưới lưỡi. Dùng 3 lần một ngày, mỗi lần 10 viên.

Mỗi đợt điều trị kéo dài 4 tuần hoặc theo chỉ định của bác sĩ.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Có phản ứng dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc.**THẬN TRỌNG:**

Không dùng cho phụ nữ có thai. Để ngoài tầm với của trẻ em.



### TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI VẬN HÀNH MÁY MÓC VÀ KHI LÁI XE:

Không có báo cáo về ảnh hưởng của thuốc khi vận hành máy móc và khi lái xe.

### TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC, CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:

Tương tác với Warfarin, có thể gây tăng thời gian chảy máu khi kết hợp.

### TÁC DỤNG NGOẠI Ý:

Nếu có bất kì phản ứng bất lợi nào trong quá trình dùng thuốc thông báo ngay cho bác sĩ của bạn.

**ĐÓNG GÓI:** Hộp 2 lọ, 100 viên/lọ, kèm ống đong viên hoàn

**BẢO QUẢN:** Đóng gói kín, để ở nhiệt độ phòng (dưới 30°C)

### THỜI HẠN SỬ DỤNG:

48 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá hạn sử dụng.

**TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:** Nhà sản xuất

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG THUỐC.  
THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN THUỐC.**

### NHÀ SẢN XUẤT:

**TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD**

No.2, Pujihe East Road, Beichen District,

Tianjin (Tasly Modern TCM Garden), Trung Quốc.

Mọi thắc mắc về sản phẩm vui lòng liên hệ VPĐD Tasly tại Việt Nam:

ĐT: 04.3736.6832/74

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ống ĐONG VIÊN HOÀN

1. Mở nắp lọ thuốc, cắm đầu to của ống đong viên hoàn vào miệng lọ.



2. Tay nắm chắc miệng lọ, dốc nghiêng lọ thuốc đồng thời lắc nhẹ lọ để các viên thuốc lăn đầy vào ống đong.



3. Dùng tay bóp nhẹ ở ngăn trên ống rồi dựng đứng lọ thuốc, lúc này trong ống đong vừa đủ 10 viên.



4. Nhấn nhẹ ngăn trên ống đong dựng thẳng đứng là lấy được thuốc viên bên trong ra dùng.

