

Rx Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

# Vitamin C STELLA 1g

1. **Tên thuốc:** Vitamin C STELLA 1g
2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc

  - Để xa tầm tay trẻ em
  - Độ ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng**
  - 3. **Thành phần công thức thuốc**

    - Thành phần hoạt chất: Vitamin C ..... 1g
    - Thành phần tá dược: Acid citric khan, sorbitol, copovidon, natri bicarbonat, aspartam, màu sunset yellow, natri carbonat khan, natri saccharin, bột mì cam 10888-71, bột mì cam 12026-31, macrogol 6000, natri benzoat.

  - 4. **Dạng bào chế:** Viên nén sủi bọt.
  - Viên nén tròn, màu hồng nhạt, hai mặt bằng, tròn, khi phả trong nước có màu vàng cam.
  - 5. **Chỉ định:** Điều trị bệnh scorbut, tăng nồng độ axit uric.
  - Cung cấp vitamin C trong một số trường hợp đặc biệt như sau sót về sự phát triển của răng và xương, viêm nướu, chảy máu nướu và long răng. Tình trạng sốt, đau run thường xuyên và nhiễm trùng (viêm phổi, ho gà, lao, bệnh bạch cầu, viêm xoang, sốt do thấp khớp,...) tăng nồng độ axit uric.
  - Cách dùng, liều dùng:** Vitamin C STELLA 1 g được dùng bằng đường uống. Hỗn tan viên thuốc trong ly nước.
  - Người lớn: 1 viên/ngày.
  - Chống chỉ định:** Quá mẫn với vitamin C hay bất cứ thành phần nào của thuốc.
  - Tránh dùng liều cao vitamin C cho những bệnh nhân:

    - Thiếu hụt glucose - 6 - phosphat dehydrogenase (nguy cơ thiếu máu tan huyết).
    - Có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu (tăng nguy cơ hình thành sỏi thận).
    - Bệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thu sắt).

  - Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:**

    - Dùng vitamin C liều cao kéo dài có thể dẫn đến tăng chuyển hóa của thuốc ("hiện tượng nhờn thuốc"), khi giảm về liều bình thường có thể gây bệnh scorbut. Dùng liều cao vitamin C trong suốt thời kỳ mang thai có thể dẫn đến bệnh scorbut cho trẻ sơ sinh.
    - Tan huyết có thể xảy ra khi dùng vitamin C cho những trẻ sơ sinh bị thiếu hụt glucose - 6 - phosphat dehydrogenase và cho trẻ sinh non khỏe mạnh khác.
    - Tăng oxalat niệu có thể xảy ra sau khi dùng liều cao vitamin C. Vitamin C có thể gây acid hóa nước tiểu, đôi khi dẫn đến kết tủa urat, cystin, hoặc sỏi oxalat, hoặc thuốc trong đường tiết niệu.
    - Vitamin C STELLA 1 g có chứa aspartam. Aspartam là nguồn tạo ra phenylalanin, có thể gây hại cho bệnh nhân bị bệnh phenylketon niệu (PKU), một rối loạn di truyền hiếm gặp gây tăng tích lũy phenylalanin do cơ thể không thể đào thải thích hợp.

  - Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:**

    - Phụ nữ có thai:** Vitamin C có qua nhau thai. Chưa có các nghiên cứu cả trên động vật và trên người mang thai, nên dùng vitamin C theo nhu cầu bình thường hàng ngày thì chưa thấy xảy ra vấn đề gì trên người. Tuy nhiên, uống những lượng lớn vitamin C trong khi mang thai có thể làm tăng nhu cầu về vitamin C và dẫn đến bệnh scorbut ở trẻ sơ sinh.
    - Phụ nữ cho con bú:** Vitamin C phân bố trong sữa mẹ. Người cho con bú dùng vitamin C theo nhu cầu bình thường chưa thấy có vấn đề gì xảy ra đối với trẻ sơ sinh.

  - 10. **Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc không có:**
  - 11. **Tương tác, tương ky của thuốc:**

    - Tương tác của thuốc:** Dùng đồng thời với ty lè trên 200 mg vitamin C với 30 mg sắt nguyên tố làm tăng hấp thu sắt qua đường dạ dày - ruột; tuy vậy, đa số người bệnh đều có khả năng hấp thu sắt uống vào một cách dày dặn mà không phải dùng đồng thời vitamin C.
    - Dùng đồng thời vitamin C với aspirin làm tăng bài tiết vitamin C và giảm bài tiết aspirin qua nước tiểu.
    - Dùng đồng thời vitamin C và fluphenazin dẫn đến giảm nồng độ fluphenazin huyết tương. Sự acid hóa nước tiểu sau khi dùng vitamin C có thể làm thay đổi sự bài tiết của các thuốc khác.
    - Vitamin C liều cao có thể phá hủy vitamin B12, cần khuyên bệnh nhân tránh uống vitamin C liều cao trong vòng một giờ trước hoặc sau khi uống vitamin B12.
    - Vitamin C là một chất khử mạnh, nên ảnh hưởng đến nhiều xét nghiệm dựa trên phản ứng oxy hóa khử. Sự co mạch vitamin C trong nước tiểu làm tăng giá tạo lượng glucose nếu định lượng bằng thuốc thử đồng (II) sulfat và giảm giá tạo lượng glucose nếu định lượng bằng phương pháp glucose oxidase.

  - Tương ky của thuốc:** Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.
  - 12. **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Tăng oxalat niệu, buồn nôn, nôn, ói nồng, co cứng cơ bụng, mệt mỏi, đờ mờ, nhức đầu, mất ngủ, và tình trạng buồn ngủ đã xảy ra. Sau khi uống liều 1 g hàng ngày hoặc lớn hơn, có thể xảy ra tiêu chảy.

**Thường gặp (1/100 ≤ ADR < 1/10)**

Thận: Tăng oxalat niệu.

**ít gặp (1/1.000 ≤ ADR < 1/100)**

- Máu: Thiếu máu toàn huyết.
  - Tim mạch: Đở bức, suy tim.
  - Thần kinh trung ương: Xùi, chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi.
  - Da dày - ruột: Buồn nôn, nôn, ói nồng, tiêu chảy.
  - Thần kinh - cơ và xương: Đau cạnh sườn.
- Hướng dẫn cách xử trí tác dụng không mong muốn**
- Không nên ngừng dùng ngay sau khi sử dụng vitamin C liều cao trong thời gian dài để phòng ngừa bệnh scorbut hồi ứng do có sự cản ứng quá trình chuyển hóa vitamin C; vì đó là một đáp ứng sinh lý và là hậu quả của dùng liều cao vitamin C trước đó.

**13. Quá liều và cách xử trí**

Những triệu chứng quá liều gồm sỏi thận, buồn nôn, viêm da dày và tiêu chảy. Gây lợi tiểu bằng truyền dịch có thể có tác dụng sau khi uống liều lớn.

**14. Đặc tính được lực học**

Nhóm được lý: Vitamin; acid ascorbic (vitamin C) đơn thuần.  
Mã ATC: A11GA01.

Acid ascorbic và các muối calci ascorbat, natri ascorbat là các dạng chủ yếu của vitamin C. Cơ thể người không tạo ra được vitamin C cho bản thân, mà phải lấy từ nguồn thức ăn. Vitamin C là một vitamin hòa tan trong nước, cần thiết để tổng hợp collagen và các thành phần của mô liên kết.

Thiếu hụt vitamin C xảy ra khi thức ăn cung cấp không đầy đủ lượng vitamin C cần thiết, dẫn đến bệnh scorbut.

Acid ascorbic có khả năng khử trong nhiều phản ứng sinh học oxy hóa - khử. Có một số chức năng sinh học của acid ascorbic đã được xác định rõ ràng, gồm có sinh tổng hợp collagen, carnitin, catecholamin, tyrosin, corticosteroid và aldosterone. Acid ascorbic cũng đã tham gia như một chất khử trong hệ thống enzym chuyển hóa thuốc cùng với cytochrome P450. Hoạt tính của hệ thống enzym này chuyển hóa thuốc này sẽ bị giảm nếu thiếu acid ascorbic. Acid ascorbic còn điều hòa hấp thu, vận chuyển và dự trữ sắt.

Acid ascorbic là một chất bảo vệ chống oxy-hóa hữu hiệu. Acid ascorbic loại bỏ ngay các loại oxy, nitro phản ứng (các ROS = Reactive oxygen species và các RNS = Reactive nitrogen species) như các gốc hydroxyl, peroxyl, superoxyd, peroxynitrit và nitroxyl, các oxy tự do và các hypoclorit, là những gốc tự do gây đột biến cho cơ thể.

*In vitro*, acid ascorbic đã chứng tỏ ngăn chặn được oxy hóa LDL bằng cách loại bỏ ROS và RNS có trong môi trường nước. LDL oxy hóa được cho là gây xơ vữa động mạch.

**15. Đặc tính được động học****Hấp thu**

Vitamin C được hấp thu dễ dàng sau khi uống; tuy vậy, hấp thu là một quá trình tích cực và có thể bị hạn chế sau những liều rất lớn. Cung cấp thường xuyên lượng vitamin C qua chế độ ăn từ 30 - 180 mg hàng ngày, khoảng 70 - 90% được hấp thu. Ở liều trên 1 g hàng ngày, sự hấp thu giảm xuống còn khoảng 50% hoặc ít hơn. Trong nghiên cứu trên người bình thường, chỉ có 50% của một liều uống 1,5 g vitamin C được hấp thu. Hấp thu vitamin C ở dạ dày - ruột có thể giảm ở người tiêu chảy hoặc có bệnh về dạ dày - ruột.

Nồng độ vitamin C bình thường trong huyết tương khoảng 10 - 20 microgram/ml. Nồng độ trong huyết tương dưới 1 - 1,5 microgram/ml khi bị scorbut. Tổng lượng vitamin C dự trữ trong cơ thể ước tính khoảng 1,5 g với khoảng 30 - 45 mg được luân chuyển hàng ngày. Dấu hiệu lâm sàng của bệnh scorbut thường trở nên rõ ràng sau 3 - 5 tháng thiếu hụt vitamin C.

**Phân bố**

Vitamin C phân bố rộng rãi trong các mô cơ thể. Nồng độ vitamin C cao được tìm thấy ở gan, bạch cầu, tiểu cầu, mô tuyến và thùy tinh thể của mắt. Khoảng 25% vitamin C trong huyết tương kết hợp với protein.

Acid ascorbic đi qua được nhau thai và phân bố trong sữa mẹ.

**Thải trừ**

Acid ascorbic oxy hóa thuận nghịch thành acid dehydroascorbic. Một ít vitamin C chuyển hóa thành những hợp chất không có hoạt tính gồm ascorbic acid-2-sulfat và acid oxalic được bài tiết trong nước tiểu. Có một ngưỡng dao động acid ascorbic qua thận khoảng 14 microgram/ml, ngưỡng này có thể thay đổi tùy theo từng người. Khi cơ thể bão hòa acid ascorbic và nồng độ máu vượt quá ngưỡng, acid ascorbic không biến đổi và đào thải vào nước tiểu. Đây là cơ sở để làm test bão hòa acid ascorbic cho tình trạng dinh dưỡng vitamin C. Khi bão hòa ở mô và nồng độ acid ascorbic ở máu thấp, acid ascorbic đào thải ít hoặc không đào thải vào nước tiểu. Acid ascorbic có thể loại bỏ được bằng thẩm phân máu.

**Quy cách đóng gói:**

Vỉ xé 4 viên. Hộp 2 vỉ.

Vỉ xé 4 viên. Hộp 4 vỉ.

Vỉ xé 4 viên. Hộp 5 vỉ.

Túýp 10 viên. Hộp 1 túýp.

Túýp 10 viên. Hộp 2 túýp.

**17. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc****17.1. Điều kiện bảo quản**

Bảo quản trong bộ kín, nơi khô, tránh ánh sáng và tránh ẩm. Nhiệt độ không quá 30°C.

**17.2. Hạn dùng**

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

**17.3. Tiêu chuẩn chất lượng**

Theo TCCS.

Địa chỉ: Số 40 đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore,

P. An Phú, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (+84 274) 3767 470 Fax: (+84 274) 3767 469

Rx Prescripion only