Số phiếu tiếp nhận HSCB: 220000001/PCBB-BYT.
https://vnras.com/drug/

SilAut

Dạng kem dùng hỗ trợ điều trị các vi tổn thương âm hộ/ âm đạo do HPV

HIỆU QUẢ TRONG:

- **HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG BIỂU MÔ GAI MỨC ĐỘ THẤP (LSIL)**
- **DỰ PHÒNG TÁI PHÁT CÁC TỔN THƯƠNG BIỂU MÔ GAI CẤP ĐỘ CAO (H SIL) ĐÃ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT**

***SILAUT** tạo một hàng rào bảo vệ, hỗ trợ điều trị các tổn thương biểu mô do HPV (Papillomavirus) gây ra và thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương.*

Thành phần: Curcumin 0.36%, Docosanol 3%, dịch chiết Emblica officinalis *2.5%*, gel lô hội 2.5%, Polidocanol 2%, Glyceryl laurate *5%*, C 12-20 (8) OE axit béo 15%, Imidazolidinyl urea Sodium dehydroacetate 0.1%, CM betaglucan 2%, EDTA disodium 0.1%, axit Lactic pH =*5*, *nước vừa đủ* 100%, dầu vaseline *5%*, parahydroxybenzoate (methyl, ethyl, propyl, butyl) 0.3%.

Chỉ định:

- Ngăn ngừa tổn thương âm đạo và cổ tử cung.
- Điều trị các bệnh lý viêm là loạn dưỡng, các vi tổn thương ở biểu mô: giúp quá trình tái tạo biểu mô và loại bỏ tế bào chết. Hỗ trợ tái tạo biểu mô tốt hơn bằng cách giữ sạch các vi tổn thương.
- Phục hồi các điều kiện sinh lý bình thường sau quá trình đốt điện hoặc nội soi tử cung.
- Điều trị khô niêm mạc âm đạo và âm hộ.
- Phục hồi các điều kiện sinh lý bình thường sau điều trị sùi mào gà âm hộ.

Quy cách đóng gói: Hộp 01 tuýp và 6 dụng cụ.

Ngày sản xuất: 36 tháng trước hạn dùng. **Số lô sản xuất, hạn dùng:** Xin xem trên bao bì của sản phẩm.

Hạn dùng được viết theo thứ tự năm / tháng. Hạn dùng sản phẩm tính đến ngày cuối cùng của tháng hết hạn.

Bảo quản: nơi khô mát và tránh ánh sáng. Sử dụng trong vòng 30 ngày sau khi mở nắp.

Liều lượng và cách dùng:

- *Viêm âm đạo:* 1 ống/ngày trong 6 ngày liên tiếp hoặc theo khuyến cáo của bác sĩ.
- *Sau điều trị u nhú bao quy đầu:* bôi 2 lần/ngày (không dùng ống) trong 6 ngày liên tiếp hoặc theo chỉ định của bác sĩ.
- *Trường hợp tổn thương nội biểu mô (SIL) do HPV:*

Tuần đầu tiên: 1 ống/ngày trong 6 ngày liên tiếp

Các tuần tiếp theo: 1-2 ống/tuần trong 3-6 tháng hoặc theo ý kiến của bác sĩ.

Trường hợp bị rát hoặc ngứa: bôi âm hộ (không dùng ống) hoặc đặt âm đạo (dùng ống) 1 lần / ngày hoặc theo ý kiến của bác sĩ.

Hướng dẫn sử dụng ống thụt âm đạo:



PATENTED

Nhà sản xuất:
LABOMAR S.p.A., Italia

Nhập khẩu và phân phối:
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔNG ĐÔ
Tầng 1, 4 tòa nhà Home City số 177, tổ 51 Phố Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội | Điện thoại: 024.35576151