

# PROSPAN®



Viên ngậm ho

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng**  
**Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ**

Viên ngậm ho PROSPAN®

**THÀNH PHẦN:** Mỗi viên ngậm chứa:

**Hoạt chất:**

Cao lá thường xuân khô (*Hederae heliis folii extractum siccum*).....26 mg chiết bằng ethanol 30% theo tỉ lệ [(5-7,5) : 1]

**Tá dược:** Acacia, sorbitol, maltitol, citric acid khan, acesulfame K, hương cam, hương frescofort, triglycerides, nước tinh khiết.

**CHỈ ĐỊNH:**

Viêm đường hô hấp cấp có kèm theo ho (long đờm, trị các chứng ho, ngứa rát cổ họng, viêm đau họng, ...)

Điều trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm phế quản mạn tính.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

**THẬN TRỌNG:**

**Phụ nữ có thai và cho con bú:**

Bởi tính an toàn của thuốc trên phụ nữ có thai vẫn chưa được xác định, do đó chỉ dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

**Rất hiếm:**

Phản ứng dị ứng (khó thở, sưng, da bị mẩn đỏ, ngứa) có thể xảy ra sau khi dùng thuốc chứa cây thường xuân.

**Không phổ biến:**

Ở những bệnh nhân nhạy cảm, tác dụng phụ trên đường tiêu hoá có thể xảy ra (buồn nôn, nôn, tiêu chảy).

**Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.**

**TƯƠNG TÁC THUỐC:**

Người ta vẫn chưa phát hiện được việc uống thuốc chung Prospan® với các thuốc khác có gây những tác dụng không mong muốn hay không, vì vậy việc sử dụng Prospan® đồng thời với các thuốc khác, ví dụ như kháng sinh là an toàn.

**Lưu ý đặc biệt:**

Cũng như các chế phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, Prospan® có thành phần hoạt chất là chất chiết xuất từ thực vật, do đó màu sắc và hương vị của thuốc đôi khi có thể bị thay đổi. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị của thuốc.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:**

Trừ khi có chỉ định khác của bác sĩ, liều dùng thông thường là:

Tuổi	Liều đơn	Tổng số liều hàng ngày
Từ 12 tuổi trở lên	1 viên Tương ứng với 26 mg cao khô	1 viên x 4 lần trên ngày
Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi	1 viên Tương ứng với 26 mg cao khô	1 viên x 2 lần trên ngày

**CÁCH DÙNG**

Viên ngậm trong miệng  
Không ngậm thuốc khi đang nằm.

**THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ**

Thời gian dùng thuốc tùy thuộc vào mức độ trầm trọng của các triệu chứng, nhưng phải dùng ít nhất là 1 tuần, ngay cả khi chỉ bị nhiễm trùng đường hô hấp nhẹ.

Để đảm bảo việc điều trị được thành công, nên dùng thuốc thêm 2-3 ngày sau khi đã hết các triệu chứng bệnh.

**BẢO QUẢN:**

Giữ thuốc trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30°C.  
Luôn để thuốc trong hộp để giữ độ ẩm của viên.

**THỜI HẠN SỬ DỤNG:**

2 năm kể từ ngày sản xuất.  
Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng

**ĐÓNG GÓI:**

Hộp chứa 2 vỉ, mỗi vỉ 10 viên

**TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:**

Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

**Giữ thuốc tránh xa tầm tay của trẻ em.**

**Nhà sản xuất (đóng gói & xuất xưởng):**

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Herzbergstrasse 3, 61138 Niederdorfelden, CHLB Đức

**Nhà sản xuất bán thành phẩm:**

Bolder Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Rheinische Allee 11, 50858 Köln-Marsdorf, CHLB Đức  
**Xuất xứ:** CHLB Đức

**Nhà nhập khẩu & phân phối:** Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm & Thương mại Sohaco, Số 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.