

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VIRGICLO

Thành phần

Mỗi viên nang mềm đặt âm đạo chứa:

- Clindamycin phosphate BP
- Tương đương clindamycin 100mg
- Clotrimazole BP 200mg
- Tá dược: vừa đủ
- Màu được phê duyệt sử dụng trong vỏ viên nang.

Công dụng (Chỉ định)

Hỗ trợ điều trị nhiễm khuẩn hỗn hợp tại âm đạo, tình trạng viêm âm đạo có kèm theo huyết trắng, hoặc nhiễm khuẩn và nấm dẫn đến ngứa, viêm âm đạo do Trichomonas, viêm âm đạo do nguyên nhân hỗn hợp. Nhiễm nấm Candida âm đạo, Viêm âm đạo do vi khuẩn, Viêm âm hộ & âm đạo do nấm Cadida

Cách dùng - Liều dùng

Cách dùng: Rửa sạch vùng âm đạo trước khi dùng.

Lấy 1 viên đặt nhẹ nhàng vào trong âm đạo, tốt nhất trong tư thế nằm ngửa, đặt càng sâu càng tốt để tránh viên đặt bị tuột ra ngoài. Tốt nhất nên đặt trước khi đi ngủ vào ban đêm.

Liều dùng:

Đặt 1 viên/ ngày, liên tục 7 ngày vào trong âm đạo trước khi đi ngủ. Tránh thời gian có kinh nguyệt

Không sử dụng trong trường hợp sau (Chống chỉ định)

Bệnh nhân mẫn cảm với Clindamycin, Clotrimazol hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

- Chảy máu âm đạo bất thường hoặc chảy máu màu lạ.
- Loét âm hộ hoặc âm đạo, mụn nước hoặc vết loét.
- Đau bụng dưới hoặc khó tiểu.
- Bất kỳ tác dụng phụ nào như đỏ, kích ứng hoặc sưng liên quan đến điều trị.
- Sốt hoặc ớn lạnh.
- Buồn nôn hoặc nôn mửa.
- Bệnh tiêu chảy.

Lưu ý khi sử dụng (Cảnh báo và thận trọng)

- Không sử dụng nếu có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm
- Nếu xuất hiện kích ứng, ngưng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ.
- Chỉ sử dụng đặt âm đạo, không được uống
- Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú hỏi ý kiến của bác sĩ.

Tác dụng không mong muốn (Tác dụng phụ)

Âm đạo xuất hiện rất, kích ứng.

Viêm đại tràng giả mạc.

Rối loạn tiêu hóa, nôn, buồn nôn.

Đau đầu, chóng mặt.

Trong quá trình sử dụng thuốc, nếu gặp phải các tác dụng không mong muốn báo ngay cho bác sĩ.

Quá liều

Không có nguy cơ quá liều nếu thuốc được sử dụng đúng liều lượng.

Trong trường hợp quá liều, điều trị hỗ trợ tại bệnh viện gần nhất.

Bảo quản

Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, ánh sáng mặt trời, nhiệt độ dưới 30 độ C

Tránh xa tầm tay trẻ em

Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Quy cách đóng gói

Hộp 1 vỉ x 7 viên đặt âm đạo

Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

SCB:240000450/PCBB-HN

Sản xuất tại: M/S CAPSOFT HEALTHCARE PVT.LTD

Địa chỉ: Khasra No.760-761, Khalsa Complex, Shed no.6, Village Karuana, Sai Road, Baddi, Distt. Solan-173205 (H.P), India

Nhà phân phối: CÔNG TY TNHH MTV TM DV QUỐC TẾ HAPPY

Địa chỉ: Số 24, Tỉnh lộ 902, Ấp Thanh Mỹ 2, Xã Thanh Đức, H. Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long.

<https://vnras.com/drug/>

VIRGICLO INSTRUCTIONS FOR USE

Composition

Each soft gelatin vaginal capsule contains:

- Clindamycin phosphate BP equivalent to clindamycin 100mg
- Clotrimazole BP 200mg
- Excipients: q.s
- Approved color used in capsules shell.

Uses (Indications)

Supports the treatment of mixed bacterial infections in the vagina, vaginitis accompanied by vaginal discharge, or bacterial and fungal infections leading to itching, vaginitis caused by Trichomonas, vaginitis caused by mixed causes. Vaginal candidiasis, Bacterial vaginitis, Candida vulvovaginitis

Usage - Dosage

Usage: Clean the vaginal area before use.

Gently insert one capsule into the vagina, ideally while lying on your back, to ensure it goes deep enough to avoid the capsule slipping out. It is recommended to do this before going to sleep at night.

Dosage:

Insert one capsule daily for 7 consecutive days into the vagina before bedtime. Avoid use during menstruation.

Do not use in the following cases (Contraindications)

Patients with sensitivity to Clindamycin, Clotrimazole, or any ingredient of the product.

- Unusual vaginal bleeding.
- Ulcers in the vagina, blisters, or ulcers.
- Lower abdominal pain or difficulty urinating.
- Any side effects related to treatment, such as rash, irritation, or swelling.
- Fever or chills.
- Nausea or vomiting.
- Diarrhea.

Cautions for use (Warnings and precautions)

- Do not use if you are sensitive to any of the product's components.
- If an allergic reaction occurs, discontinue use and consult a doctor.
- For vaginal use only, not for oral consumption.
- Pregnant or breastfeeding women should consult a doctor.

Undesirable Effects (Adverse drug reactions)

May cause vaginal discomfort and irritation, colitis, digestive disorders, nausea, vomiting, headache, and dizziness. If you experience any undesirable effects during use, consult a doctor immediately.

Overdose

There is no risk of overdose if the drug is used as directed. In case of overdose, seek immediate medical attention at the nearest hospital.

Storage

Store in a sealed package, away from moisture, sunlight, and temperatures below 30 degrees Celsius.

Keep out of reach of children.

Please read the instructions carefully before use.

Packaging

Box containing 1 blister with 7 vaginal capsules.

Expiration Date

36 months from the manufacturing date.

Registration number: 240000450/PCBB-HN

Manufacturer: M/S CAPSOFT HEALTHCARE PVT.LTD

Address: Khasra No.760-761, Khalsa Complex, Shed no.6, Village Karuana, Sai Road, Baddi, Distt.Solan-173205(H.P), India

Distributor: HAPPY INTERNATIONAL SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ: No. 24, Provincial Road 902, Thanh My 2 Hamlet, Thanh Duc Commune, Long Ho District, Vinh Long Province.

<https://vnras.com/drug/>