

910 / 159

LUNGASTIC 20

Hộp 03 vỉ x 10 viên nén
Kích thước: 97 x 44 x 18 mm

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 19/09/2018



TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Trần Đình Hùng

LUNGASTIC 20


Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Kích thước: 97 x 44 x 50 mm



<https://vnras.com/drug/>

LUNGASTIC 20

Vi 10 viên nén
Kích thước: 92 x 40 mm



TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Trần Đình Hương

Thông tin thuốc dành cho bệnh nhân

LUNGASTIC 20

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG CỦA THUỐC

- Dược chất: Bambuterol hydrochlorid 20 mg
- Tá dược: Lactose monohydrat, cellulose vi tinh thể 101, povidon K30, natri croscarmellose, magnesi stearat, silic dioxide keo khan.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Viên nén hình caplet, màu trắng, hai mặt lõm, một mặt có khắc vạch ngang giữa hai chữ "H" và "S", cạnh và thành viên lành lặn.

QUY CÁCH DÙNG GỐI

- Hấp 03 viên x 10 viên nén. Vi hình AI - PVC đục.
- Hấp 05 viên x 10 viên nén. Vi hình AI - PVC đục.
- Hấp 10 viên x 10 viên nén. Vi hình AI - PVC đục.

THUỐC DÙNG CHO BỆNH NHÂN

Viên nén Lungastic 20 chứa bambuterol hydrochlorid, thuộc nhóm thuốc giãn phế quản.

- Thuốc giãn phế quản giúp mở rộng đường dẫn khí của phổi.
- Viên nén Lungastic 20 được sử dụng để điều trị các vấn đề về hô hấp ở những người bị bệnh hen suyễn và các bệnh lý tương tự. Lungastic 20 được sử dụng đều đặn để ngăn ngừa các vấn đề về hô hấp. Không nên sử dụng đơn lẻ Lungastic 20 để điều trị hen suyễn hoặc các bệnh lý hô hấp khác. Lungastic 20 chỉ được dùng khi bác sĩ đã cho bạn dùng một loại thuốc khác giúp làm giảm sưng và viêm ở phổi như "corticoid dạng hít". Tuy nhiên, viên nén Lungastic 20 sẽ không làm giảm cơn hen suyễn cấp tính đã khởi phát.

NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO

Dùng thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ. Kiểm tra lại với bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn không chắc chắn về cách dùng thuốc.

- Viên nén Lungastic 20 chỉ được sử dụng kết hợp với thuốc khác như corticoid dạng hít.
- Liều khuyến cáo là 1 viên nén Lungastic 20 trước khi ngủ.
- Không nhai hay làm vỡ viên thuốc.
- Uống ngay viên thuốc với một cốc nước.
- Nếu cần thiết có thể đổi viên thuốc.

KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC NÀY

- Dùng với bambuterol hydrochlorid hay với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Không nên dùng thuốc cho trẻ em.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Giống như các thuốc khác, Lungastic 20 có thể gây ra một số tác dụng không mong muốn mặc dù không phải bệnh nhân nào cũng mắc phải.

- **Phản ứng dị ứng (quá mẫn)**
 - Phản ứng dị ứng có thể xảy ra khi dùng Lungastic 20. Tần suất xảy ra chưa được biết chính xác. Nếu bạn bị dị ứng, ngưng sử dụng thuốc và đến gặp bác sĩ ngay lập tức.
 - Phản ứng dị ứng bao gồm: sưng mắt, phát ban da, khó thở, huyết áp thấp (cảm thấy choáng, ngất) và ngất quỵ.
 - Bạn có thể bị co thắt phế quản (co cơ ở đường thở gây khó thở khò khè), chẹn biết chính xác tần suất xảy ra. Nếu cảm giác khó thở tiến đột ngột sau khi dùng thuốc, ngưng sử dụng thuốc và gặp bác sĩ ngay lập tức.

Thông báo cho bác sĩ nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu sau:

- Yếu cơ, khát hay cảm giác kiệt sức. Điều này có thể do lượng kali trong máu của bạn thấp. Tần suất của những triệu chứng trên chưa được biết rõ. Các triệu chứng này có thể xảy ra hơn nếu bạn bị hen suyễn nghiêm trọng hay bạn đang dùng thuốc steroid, theophyllin, aminophyllin hay thuốc lợi tiểu.
- Bệnh lý về tim mạch như rối loạn nhịp tim thường xảy ra khi dùng thuốc nhóm chủ vận thụ thể β_2 ở những bệnh nhân có nguy cơ cao.

Các tác dụng không mong muốn khác:

- **Đau thường gặp (ảnh hưởng hơn 1 người trong 10 người):** Run, đau đầu, buồn nôn.
- **Thường gặp (ảnh hưởng 1 - 10 người trong 100 người):** Đánh trống ngực, chuột rút, khó ngủ.
- **Ít gặp (ảnh hưởng 1 - 10 người trong 1000 người):** Kích động, tim đập nhanh, nhịp tim bất thường.
- **Không rõ tần suất (ảnh hưởng ước tính dựa vào các dữ liệu có sẵn):** Cảm giác ồm ồm (buồn nôn), tăng động, lượng đường trong máu cao, chóng mặt.
- Mặc dù không biết chính xác tần suất xảy ra nhưng một vài người đã từng bị đau ngực (do bệnh lý tim mạch như đau thắt ngực). Thông báo cho bác sĩ nếu bạn tiến triển những triệu chứng này khi điều trị với Lungastic 20, không nên ngưng thuốc khi chưa có chỉ định.
- Một vài tác dụng không mong muốn kể trên có thể biến mất sau 1 - 2 tuần sau điều trị.
- Nếu các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hoặc bạn gặp bất kỳ tác dụng không mong muốn nào chưa được đề cập trong tờ hướng dẫn này, thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ.

NÊN TRÁNH DÙNG NHỮNG THUỐC HOẶC THỰC PHẨM KHI DÙNG SỬ DỤNG THUỐC NÀY

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những thuốc bạn đang hoặc vừa sử dụng gần đây, bao gồm thuốc không kê đơn, vì Lungastic 20 có thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc khác và ngược lại nếu sử dụng đồng thời, đặc biệt là các thuốc sau:

- Thuốc steroid (prednisolon).
 - Theophyllin hay aminophyllin (điều trị các bệnh hô hấp).
 - Thuốc ức chế thụ thể beta (thuốc điều trị tăng huyết áp hay các bệnh lý tim mạch như propranolol, thuốc nhỏ mắt điều trị glaucôm như timolol).
 - Thuốc lợi tiểu.
 - Adrenalin, còn gọi là epinephrin (thuốc kích thích tim).
 - Các thuốc có chứa ipratropium.
- Có thể có ảnh hưởng đến sự cân bằng của chất điện giải trong máu (lượng kali máu thấp) khi Lungastic 20 được sử dụng đồng thời với một số thuốc khác. Điều này thường không quan trọng, nhưng trong một số trường hợp có thể ảnh hưởng đến nhịp tim.

CẦN LÀM GÌ KHI MỘT LẦN QUÊN DÙNG THUỐC

Nếu quên dùng thuốc, uống ngay sau khi nhớ ra. Nếu thời điểm nhớ ra gần với thời điểm uống liều tiếp theo, hãy bỏ qua liều đã quên và tiếp tục uống liều tiếp theo như thường lệ.

CẦN BẢO QUẢN THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO

- Bảo quản thuốc ở nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng.
- Không sử dụng thuốc sau khi hết hạn sử dụng được ghi trên hộp thuốc hay vỉ thuốc.
- Không nên vùi bỏ thuốc vào nước thải hay rác sinh hoạt. Hãy y kiến được sử dụng cách bỏ thuốc không sử dụng nữa. Những biện pháp này sẽ giúp bảo vệ môi trường.

NHỮNG DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU

Khi dùng quá liều viên nén Lungastic 20 có thể có các triệu chứng như đau đầu, lo lắng, run, nôn mửa, chuột rút, đánh trống ngực, nhịp tim nhanh, loạn nhịp tim.

CẦN PHẢI LÀM GÌ KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU KHIUYN CAO

Nếu bạn dùng thuốc quá liều, thông báo cho bác sĩ hoặc đến ngay bệnh viện gần nhất. Nhớ mang theo thuốc của bạn.

NHỮNG ĐIỀU CẦN THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC NÀY

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng Lungastic 20 nếu:

- Bạn bị đái tháo đường. Bạn cần được kiểm tra lượng đường trong máu trước khi bắt đầu điều trị với Lungastic 20.
- Bạn có tiền sử bệnh tim mạch, rối loạn nhịp tim hay đau ngực (đau thắt ngực).
- Bạn bị cường giáp.
- Bạn có các bệnh lý về gan hoặc thận.
- Bạn sắp được gây mê tổng quát trong phẫu thuật, kể cả phẫu thuật răng.
- Bạn có tiền sử gia đình bệnh glaucôm (tăng nhãn áp).
- Viên nén Lungastic 20 có chứa lactose. Nếu bạn đang gặp kèm một số loại đường, thông báo cho bác sĩ trước khi sử dụng thuốc.

Phụ nữ mang thai: Nếu bạn mang thai, nghĩ rằng mình mang thai hoặc có kế hoạch mang thai, hãy y kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng thuốc. Nếu bạn mang thai khi đang dùng thuốc, thông báo cho bác sĩ ngay lập tức. Lungastic 20 nên được sử dụng thận trọng vào cuối thai kỳ vì gây giãn tử cung.

Phụ nữ cho con bú: Hãy y kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng thuốc. Chưa biết viên thuốc có qua được sữa mẹ hay không. Thông báo cho bác sĩ trước khi cho con bú nếu bạn đang sử dụng viên nén Lungastic 20.

Ảnh hưởng của thuốc đối với công việc: Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe, vận hành máy móc, làm việc trên cao hoặc các trường hợp khác.

KHI NÀO CẦN THAM VẤN BÁC SĨ, DƯỢC SĨ

- Thông báo cho bác sĩ ngay lập tức nếu:
 - Bạn ngày càng khó thở.
 - Bạn thường tỉnh giấc lúc nửa đêm và thở khó khê hay khó thở.
 - Bạn bắt đầu có những cơn đau ngực.
 - Viên nén Lungastic 20 không giúp cho bạn dễ thở hơn.
- Nếu bất kỳ vấn đề trên xảy ra có nghĩa là cơn hen của bạn vẫn chưa được kiểm soát. Bạn cần một phác đồ điều trị khác (hay một chế độ điều trị bổ sung ngay lập tức).

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

HẠN DÙNG

36 tháng (kể từ ngày sản xuất).

NGÀY XEM XÉT SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT LẠI NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC



CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH
HASAN - DERMAPHARM

Lô B, Đường số 2, KCN Đồng An, Bình Dương, Việt Nam