



THẬN TRỌNG

Đã ghi nhận hiện tượng đặc thù tinh thể dưới bao sau sau khi sử dụng corticosteroid tại chỗ liều cao và kéo dài trong nhãn khoa. Viêm màng mạch nhô trước cấp tính có thể xảy ra ở một số cá thể nhạy cảm. Việc sử dụng steroid sau phẫu thuật đặc nhân mắt có thể làm chậm lành vết mổ và làm tăng khả năng nhiễm chủng mực rộp. Nếu có các dấu hiệu mẩn cảm hoặc xảy ra các phản ứng nghiêm trọng, ngưng dùng thuốc ngay. Hiện tượng mẩn cảm chéo giữa các corticosteroid đã được chứng minh đầy đủ (xem mục **TÁC DỤNG PHỤ**).

TÁC ĐỘNG KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Sau khi nhô thuốc, bệnh nhân có thể bị nhìn mờ thoáng qua, điều này có thể làm suy giảm khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc. Nếu bị ảnh hưởng, bệnh nhân không nên lái xe hoặc vận hành máy móc cho đến khi nhìn rõ trở lại.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC

Chưa có dữ liệu.

TÁC DỤNG PHỤ

Gây tăng nhãn áp kèm theo tổn thương thần kinh thị giác, giảm thị trường. Còn có thể gây đặc thù tinh thể dưới bao sau; nhiễm trùng thứ phát do nấm hoặc do các virus được phong thích từ mô mắt; thủng nhân cầu khi dùng trong trường hợp mòng giặc mạc hoặc cung mạc; chậm lành vết thương. Những chế phẩm chứa corticosteroid là nguyên nhân gây bệnh viêm màng mạch nhô trước cấp tính hoặc làm thủng nhân cầu. Giãn đồng tử, mất khả năng điều trị thị lực và hiện tượng sụp mi mắt hiếm khi xảy ra khi sử dụng corticosteroid tại chỗ. Một số tác dụng phụ toàn thân có thể xảy ra khi sử dụng steroid liều cao. Rất hiếm trường hợp nhiễm độc toàn thân do dùng quá liều corticoid sau khi dùng steroid tại chỗ.

Các tác dụng phụ sau đây đã được xác định trong quá trình sử dụng PRED FORTE® sau khi được phê duyệt. Do các tác dụng này được báo cáo tự nguyện từ một nhóm dân số có quy mô không xác định, không phải luôn luôn có thể ước tính đáng tin cậy về tần suất của những tác dụng này hoặc thiết lập mối quan hệ nhân quả với việc sử dụng thuốc.

Rối loạn hệ miễn dịch: Quá mẫn, mề đay.

Rối loạn hệ thần kinh: Nhức đầu.

Rối loạn mắt: Đặc thù tinh thể dưới bao sau, kích ứng mắt, xuyên thủng mắt (thủng cung mạc hoặc giác mạc), cảm giác có dị vật trong mắt, tăng nhãn áp, giãn đồng tử, sung huyết mắt, nhiễm trùng mắt (bao gồm nhiễm khuẩn, nhiễm nấm và nhiễm virus), nhìn mờ/ rối loạn thị giác.

Rối loạn tiêu hóa: Loạn vị giác.

Rối loạn da và mô dưới da: Ngứa, phát ban.

Thông báo ngay cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Thuốc tra mắt

Nhỏ 1 đến 2 giọt vào túi kết mạc từ 2 đến 4 lần trong ngày. Trong 24 đến 48 giờ đầu, liều có thể tăng lên 2 giọt mỗi giờ. Lưu ý không nên ngưng thuốc sớm.

QUÁ LIỀU

Quá liều thuốc dùng tại chỗ ở mắt không thường gây ra vấn đề cấp tính. Nếu vô ý nuốt phải, uống nước để làm loãng thuốc.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hỗn dịch nhỏ mắt vỏ khuẩn chứa trong lọ nhựa loại nhỏ giọt 5 ml.

Chú ý: Bảo quản ở nhiệt độ từ 15° – 25°C. Giữ lọ thuốc ở thế thẳng đứng. Tránh để đông lạnh. **Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ. Để xa tầm tay của trẻ em.**

Không dùng quá 30 ngày sau khi mở. Không sử dụng khi thuốc quá hạn. **Lắc kỹ trước khi dùng.**

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất



ALLERGAN

Nhà sản xuất:

ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND
Castlebar Road, Westport, County Mayo, Ireland.

© 2015 Allergan, Inc

Các nhãn hiệu * thuộc sở hữu của Allergan, Inc.
Ngày sửa đổi: Tháng 7 năm 2014