

316/146 hư



BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT  
Lần đầu: 12/8/2014

**DISMOLAN**

Chỉ định và  
dùng: Dùng để điều trị  
các bệnh viêm đường  
hô hấp trên và dưới.  
Đặc biệt: Trong điều trị viêm đường  
hô hấp trên và dưới.  
Dùng được ở bệnh nhi và người già.

Đặc tính dược lý và tác dụng  
của thuốc: Thuốc có tác dụng  
kháng khuẩn và chống  
viêm.

Thầy thuốc phải  
đọc kỹ hướng dẫn  
dùng thuốc và  
các thông tin khác  
trên bao bì của thuốc.

Thầy thuốc phải  
đọc kỹ hướng dẫn  
dùng thuốc và  
các thông tin khác  
trên bao bì của thuốc.

**DISMOLAN**  
Acetylcystein  
200 mg/10 ml

8 vỉ x 10 ống tương  
200mg/10ml

Chỉ định và  
dùng: Dùng để điều trị  
các bệnh viêm đường  
hô hấp trên và dưới.  
Đặc biệt: Trong điều trị viêm đường  
hô hấp trên và dưới.  
Dùng được ở bệnh nhi và người già.

Đặc tính dược lý và tác dụng  
của thuốc: Thuốc có tác dụng  
kháng khuẩn và chống  
viêm.

Thầy thuốc phải  
đọc kỹ hướng dẫn  
dùng thuốc và  
các thông tin khác  
trên bao bì của thuốc.

Thầy thuốc phải  
đọc kỹ hướng dẫn  
dùng thuốc và  
các thông tin khác  
trên bao bì của thuốc.

**DISMOLAN**  
Acetylcystein  
200 mg/10 ml



<https://vnras.com/drug/>

**DISMOLAN**

Chỉ định và  
dùng: Dùng để điều trị  
các bệnh viêm đường  
hô hấp trên và dưới.  
Đặc biệt: Trong điều trị viêm đường  
hô hấp trên và dưới.  
Dùng được ở bệnh nhi và người già.

Đặc tính dược lý và tác dụng  
của thuốc: Thuốc có tác dụng  
kháng khuẩn và chống  
viêm.

Thầy thuốc phải  
đọc kỹ hướng dẫn  
dùng thuốc và  
các thông tin khác  
trên bao bì của thuốc.

Thầy thuốc phải  
đọc kỹ hướng dẫn  
dùng thuốc và  
các thông tin khác  
trên bao bì của thuốc.

**DISMOLAN**  
Acetylcystein  
200 mg/10 ml

8 vỉ x 10 ống tương  
200mg/10ml

Chỉ định và  
dùng: Dùng để điều trị  
các bệnh viêm đường  
hô hấp trên và dưới.  
Đặc biệt: Trong điều trị viêm đường  
hô hấp trên và dưới.  
Dùng được ở bệnh nhi và người già.

Đặc tính dược lý và tác dụng  
của thuốc: Thuốc có tác dụng  
kháng khuẩn và chống  
viêm.

Thầy thuốc phải  
đọc kỹ hướng dẫn  
dùng thuốc và  
các thông tin khác  
trên bao bì của thuốc.

Thầy thuốc phải  
đọc kỹ hướng dẫn  
dùng thuốc và  
các thông tin khác  
trên bao bì của thuốc.

**DISMOLAN**  
Acetylcystein  
200 mg/10 ml



**Acetylcystein 200 mg/10 ml**

# DISMOLAN



**DISMOLAN**  
Acetylcystein 200 mg/10 ml

loãng đờm trong

Tan đờm

Giải phóng  
quản cấp  
và viêm

**6 vi x Sóng uống**  
200mg/10ml

**DISMOLAN**

Dạng bào chế: Dung dịch uống  
Thành phần: 100 mg Acetylcystein/10 ml dung dịch.

**Chỉ định:**  
Tắc nghẽn trong bệnh nhân mắc các bệnh lý hô hấp cấp tính như viêm phổi, viêm phế quản cấp tính, viêm tiểu phế quản cấp tính, viêm màng phổi cấp tính và các bệnh lý hô hấp khác liên quan.

**Giải thích:** Giải phóng nhầy và loãng đờm giúp dễ dàng hít thở.

**Lưu ý:**  
Hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất.

**Chống chỉ định:**  
Thận trọng: Trẻ em dưới 2 tuổi, bệnh nhân suy thận, suy gan, bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc chống đông máu, bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc chống tiểu cầu.

**Cấp độ tương tác thuốc:** Không nên sử dụng đồng thời với thuốc chống đông máu.

**DISMOLAN**  
Acetylcystein 200 mg/10 ml

loãng đờm trong

Tan đờm

Giải phóng  
quản cấp  
và viêm

**6 vi x Sóng uống**  
200mg/10ml

**DISMOLAN**  
Acetylcystein 200 mg/10 ml



**DISMOLAN**

Số đăng ký: 24.0.0.00  
Ngày sản xuất: 20/06/2017  
Hạn sử dụng: 06/2018

Bào quản: Trung Quốc (CN), Thành lập: Việt Nam  
Số đăng ký trong Sổ Dược 2017  
Chức năng: Giải phóng nhầy và loãng đờm

Được kê thuốc đặc biệt theo quy định của Bộ Y tế

Nhà phân phối:

Nhà sản xuất:  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TÂN THỊNH  
Số 10 Đường số 10, Khu phố 10, Phường  
Thạnh Mỹ Lợi, Quận 25, Hồ Chí Minh

Acetylcystein 200 mg/10 ml

# DISMOLAN


Acetylcystein 200 mg/10 ml

Tiêu  
nhảy

Tan  
đờm

loang đờm  
trong

Viên pha  
quần cấp  
và man



**4 vỉ x 5 ống uống**  
200mg/10ml



## DISMOLAN

Acetylcystein 200 mg/10 ml

**Dạng bào chế:** Dung dịch uống

**Thành phần:** Mỗi ống 10 ml chứa Acetylcystein 200 mg

**Chỉ định:**  
Tiêu chảy trong viêm mũi, viêm họng, viêm cổ họng cấp, viêm thanh quản cấp, viêm khí quản cấp, viêm phế quản cấp và mạn.

**Đặc tính:** Là dung dịch và uống tiện lợi dùng đơn giản.

**Liều lượng:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

**Chống chỉ định:**  
Tuyệt đối tránh 2 tuần, bệnh nhân sử dụng với ampicillin và các thuốc khác trong nhóm của thuốc, bệnh nhân sử dụng sản phẩm này.

**Các thông tin khác:** Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

## DISMOLAN

Acetylcystein 200 mg/10 ml

Tiêu  
nhảy

Tan  
đờm

loang đờm  
trong

Viên pha  
quần cấp  
và man



**4 vỉ x 5 ống uống**  
200mg/10ml



## DISMOLAN

Acetylcystein 200 mg/10 ml

**Chỉ định:**  
Số 18/2017  
Ngày sản xuất: 01/01/2017  
Hạn sử dụng: 01/01/2018  
Bảo quản: Trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

**Công thức:** 5 ống thuốc x 4 vỉ hộp

**Đặc tính:** Dung dịch uống đơn giản, tiện lợi.

**Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em.**

**Nhà sản xuất:**

**Nhà sản xuất:**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TÂN THỊNH  
Số 18 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường  
Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

# DISMOLAN

Acetylcystein 200 mg/10 ml

<https://vnras.com/drug/>



Acetylcystein 200 mg/10 ml

**DISMOLAN**

**DISMOLAN**

Acetylcystein

200 mg/10 ml



**2 vì x 5 sống uống**  
200mg/10ml

S.Đ.K.K.D.: 0104089394 - C.T.C.P.  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
CPC1 HÀ NỘI**

**DISMOLAN**  
Acetylcystein  
200 mg/10 ml

**Dạng bào chế:** Dung dịch uống  
**Thành phần:** Mỗi ống 10 ml chứa: Acetylcystein.....200 mg  
**Chỉ định:**  
Tiêu chảy trong bệnh nham huyết, bệnh lý hô hấp có đờm dầy quánh như trong viêm phế quản cấp và mạn tính, làm sạch đường quy trong mờ khí quản.  
**Giải độc trong quá liều paracetamol**  
**Liều lượng, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác:** xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng

Số đăng ký:  
Số lô SX:  
Ngày sản xuất: dd/mm/yy  
Hạn sử dụng: dd/mm/yy

**Bảo quản:**  
Trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.  
Quy cách: 5 ống nhựa/vỉ x 2 vỉ/hộp  
Lưu ý: Giữ hướng dẫn sử dụng thuốc, khí dung để trước tránh xa tầm với trẻ em



**Nhà sản xuất:**  
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội  
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội

**Nhà phân phối:**

S.Đ.K.K.D.: 0101369379 - C.T.T.H.H.  
**CÔNG TY  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
DƯỢC PHẨM  
TÂN  
DINH Y**

**DISMOLAN**  
Acetylcystein  
200 mg/10 ml

**DISMOLAN**

Acetylcystein 200 mg/10 ml

<https://vnras.com/drug/>

Nhãn thực tế (100% kích thước)



Nhãn 200% kích thước



<https://vnras.com/drug/>



**Tờ hướng dẫn sử dụng**

**DISMOLAN**

Dung dịch uống acetylcystein 200 mg/10ml

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*

*Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ, dược sỹ.*

**Tên thuốc** DISMOLAN  
**Thành phần** Mỗi ống 10 ml chứa:

*Hoạt chất:* Acetylcystein 200,0 mg.

*Tá dược:* Sucrose, glycerin, natri edetat, dinatri hydrophosphat, kali dihydrophosphat, sucralose, hương táo, methyl paraben, propyl paraben, FD&C Green 3, nước tinh khiết.

**Dạng bào chế** Dung dịch uống.

**Đường dùng** Đường uống.

**Quy cách đóng gói** 10 ml/ống nhựa, 5 ống nhựa/vi  
Hộp 2 vi, 4 vi, 6 vi, 8 vi

**Đặc tính dược lực học**

Acetylcystein (N - acetylcystein) là dẫn chất N - acetyl của L - cystein, một amino - acid tự nhiên. Acetylcystein được dùng làm thuốc tiêu chất nhầy và thuốc giải độc khi quá liều paracetamol. Thuốc làm giảm độ quánh của đờm ở phổi có mũ hoặc không bằng cách tách đôi cầu nối disulfua trong mucoprotein và tạo thuận lợi để tổng đờm ra ngoài bằng ho, dẫn lưu tư thế hoặc bằng phương pháp cơ học.

Acetylcystein dùng để bảo vệ chống gây độc cho gan do quá liều paracetamol, bằng cách duy trì hoặc khôi phục nồng độ glutathion của gan là chất cần thiết để làm bất hoạt chất chuyển hóa trung gian của paracetamol gây độc cho gan. Trong quá liều paracetamol, một lượng lớn chất chuyển hóa này được tạo ra vì đường chuyển hóa chính (liên hợp glucuronid và sulfat) trở thành bão hòa. Acetylcystein chuyển hóa thành cystein kích thích gan tổng hợp glutathion và do đó, acetylcystein có thể bảo vệ được gan nếu bắt đầu điều trị trong vòng 12 giờ sau quá liều paracetamol. Bắt đầu điều trị càng sớm càng tốt.

**Đặc tính dược động học**

Sau khi uống, acetylcystein được hấp thu nhanh ở đường tiêu hóa và bị gan khử acetyl thành cystein và sau đó được chuyển hóa. Đạt nồng độ đỉnh huyết tương trong khoảng 0,5 đến 1 giờ sau khi uống liều 200 đến 600 mg. Khả dụng sinh học khi uống thấp và có thể do chuyển hóa trong thành ruột và chuyển hóa bước đầu trong gan. Độ thanh thải thận có thể chiếm 30% độ thanh thải toàn thân. Thời gian bán thải: 6,25 giờ sau khi uống.

**Chỉ định**

**Dismolan** được dùng trong các trường hợp:

- Được dùng làm thuốc tiêu chất nhầy trong bệnh nhầy nhớt (mucoviscidosis) (xơ nang tuyến tụy), bệnh lý hô hấp có đờm nhầy quánh như trong viêm phế quản cấp và mạn, và làm sạch thường quy trong mở khí quản.
- Được dùng làm thuốc giải độc trong quá liều paracetamol.

**Liều lượng và cách dùng**

*Cách dùng*

**Dismolan** được dùng bằng đường uống. Bẻ ống nhựa và uống trực tiếp dung dịch trong ống.

*Liều dùng*



- Làm thuốc tiêu nhày:
- Người lớn: 1 ống 10 ml x 3 lần/ngày.
- Trẻ em từ 2 – 6 tuổi: 1 ống 10 ml x 2 lần/ngày.
- Giải độc paracetamol: Liều đầu tiên 140 mg/kg, tiếp theo là 70 mg/kg, uống cách nhau 4 giờ một lần, tổng cộng 17 lần. Acetylcystein được thông báo rất hiệu quả khi dùng trong vòng 8 giờ sau khi bị quá liều paracetamol. Hiệu quả giảm sau thời gian đó, nhưng gần đây cho rằng điều trị chậm tới 24 giờ sau vẫn có ích.

### Chống chỉ định

- Trẻ em dưới 2 tuổi
- Bệnh nhân quá mẫn với acetylcystein và bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Bệnh nhân có tiền sử hen (nguy cơ phản ứng co thắt phế quản với tất cả các dạng thuốc chứa acetylcystein).

### Thận trọng

- Phải giám sát chặt chẽ người bệnh có nguy cơ phát hen, nếu dùng acetylcystein cho người có tiền sử dị ứng; nếu có co thắt phế quản, phải dùng thuốc phun mù giãn phế quản như salbutamol (thuốc beta - 2 adrenergic chọn lọc, tác dụng ngắn) hoặc ipratropium (thuốc kháng muscarin) và phải ngừng acetylcystein ngay.
- Khi điều trị với acetylcystein, có thể xuất hiện nhiều đờm loãng ở phế quản, cần phải hút để lấy ra nếu người bệnh giảm khả năng ho.

### Tác dụng không mong muốn (ADR)

Acetylcystein có giới hạn an toàn rộng. Tuy hiếm gặp co thắt phế quản rõ ràng trong lâm sàng do acetylcystein, nhưng vẫn có thể xảy ra với tất cả các dạng thuốc chứa acetylcystein.

*Thường gặp, ADR > 1/100*

- Buồn nôn, nôn.

*Ít gặp, 1/1000 < ADR < 1/100*

- Buồn ngủ, nhức đầu, ù tai.
- Viêm miệng, chảy nước mũi nhiều.
- Phát ban, mào đay.

*Hiếm, ADR < 1/1000*

- Co thắt phế quản kèm phản ứng dạng phản vệ toàn thân.
- Sốt, rét run.

*Hướng dẫn cách xử trí ADR*

- Dùng dung dịch acetylcystein pha loãng có thể giảm khả năng gây nôn nhiều do thuốc.
- Phải điều trị ngay phản ứng phản vệ bằng tiêm dưới da adrenalin (0,3 - 0,5 ml dung dịch 1/1000) thở oxy 100%, đặt nội khí quản nếu cần, truyền dịch tĩnh mạch để tăng thể tích huyết tương, hít thuốc chủ vận beta - adrenergic nếu co thắt phế quản, tiêm tĩnh mạch 500 mg hydrocortison hoặc 125 mg methylprednisolon.
- Có thể ức chế phản ứng quá mẫn với acetylcystein bao gồm phát hồng ban toàn thân, ngứa, buồn nôn, nôn, chóng mặt, bằng dùng kháng histamin trước. Có ý kiến cho rằng quá mẫn là do cơ chế giả dị ứng trên cơ sở giải phóng histamin hơn là do nguyên nhân miễn dịch. Vì phản ứng quá mẫn đã xảy ra tới 3% số người tiêm tĩnh mạch acetylcystein để điều trị quá liều paracetamol, nên các thầy thuốc cần chú ý dùng kháng histamin để phòng phản ứng đó. diphenhydramin.

  
 S. S.  
 CÔNG PHÂN  
 DƯỢC PHẨM  
 P. P.  
  
 3369379  
 CÔNG TY  
 NHIỆM VỤ  
 DƯỢC PHẨM  
 TÂN THỊNH  
 TH. XUÂN - T.

**Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ khi gặp phải các tác dụng phụ của thuốc.**

**Trương tác thuốc**

- Acetylcystein là một chất khử nên không phù hợp với các chất oxy - hóa.
- Không được dùng đồng thời các thuốc ho khác hoặc bất cứ thuốc nào làm giảm bài tiết phế quản trong thời gian điều trị bằng acetylcystein.

**Thời kỳ mang thai và cho con bú**

**Thời kỳ mang thai**

Điều trị quá liều paracetamol bằng acetylcystein ở người mang thai có hiệu quả và an toàn, và có khả năng ngăn chặn được độc tính cho gan ở thai nhi cũng như ở người mẹ.

**Thời kỳ cho con bú**

Thuốc dùng an toàn cho người cho con bú.

**Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc**

Thận trọng khi lái xe và vận hành máy móc.

**Quá liều và xử trí**

Quá liều acetylcystein có triệu chứng tương tự như triệu chứng của phản vệ, nhưng nặng hơn nhiều: Đặc biệt là giảm huyết áp. Các triệu chứng khác bao gồm suy hô hấp, tan máu, đông máu rải rác nội mạch và suy thận. Tử vong đã xảy ra ở người bệnh bị quá liều acetylcystein trong khi đang điều trị nhiễm độc paracetamol. Điều trị quá liều theo triệu chứng.

**Bảo quản** Trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

**Hạn dùng** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

<https://vnras.com/drug/>

Nhà sản xuất

**Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội**

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.



PHÓ CỤC TRƯỞNG  
*Nguyễn Việt Hưng*

