



THÀNH PHẦN:

| | |
|---|-------|
| Mỗi viên nang mềm chứa: | |
| Näm men khô chứa selen (Tương ứng với 50 mcg selen) | 25 mg |
| Näm men khô chứa crom (Tương ứng với 50 mcg crom) | 25 mg |
| Acid ascorbic | 50 mg |
| (Tá dược: Dầu đậu nành, lecithin, dầu cọ, sáp ong trắng, gelatin, glycerin, sorbitol, methylparaben, propylparaben, vanillin, titan oxyd, chocolate brown). | |

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang mềm

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

- Hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm.
- Hộp 4 vỉ x 15 viên nang mềm.
- Hộp 6 vỉ x 15 viên nang mềm.

CHỈ ĐỊNH:

- Ngăn ngừa quá trình lão hóa.
- Tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng cho cơ thể, phòng chống các bệnh dị ứng, ung thư da.
- Cải thiện chức năng gan trong các bệnh gan cấp tính, mạn tính, các tổn thương gan do rượu, bia, thuốc hoặc hóa chất thuốc và hóa chất trong điều trị ung thư.
- Phòng ngừa đục nhân mắt, mờ mắt, căng nhức mỏi mắt.
- Bổ sung vitamin C và các nguyên tố vi lượng.

LIỆU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Dùng theo đường uống.
Ngày 1 – 2 viên, hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ.
Dùng thuốc liên tục 30 ngày. Nên dùng lặp lại 15 ngày sau khi dừng thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG:

Dùng thuốc thận trọng với phụ nữ có thai và cho con bú.

Tài liệu thông tin thuốc

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không nên dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú. Chỉ dùng khi thật sự cần thiết.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Thuốc có thể làm cho bệnh Crohn tiến triển xấu. Các tác dụng không mong muốn có thể xảy ra: Đầu đau, buồn nôn, nôn, tiêu chảy.

Ngưng dùng thuốc các triệu chứng sẽ hết.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ khi gặp phải các tác dụng không mong muốn của thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Các thuốc ức chế MAO có thể làm giảm hấp thu Enzicoba.

Acid ascorbic có thể làm giảm sinh khả dụng đường uống của propranolol. Do vậy có thể phải hiệu chỉnh liều của propranolol khi dùng đồng thời hai thuốc này.

Các thuốc chống nám có thể làm giảm khả năng hấp thu selen, crom (trong nám men).

Các thuốc làm giảm acid dạ dày (antacid) có thể làm giảm khả năng hấp thu của dạ dày đối với selen.

Khi dùng các corticosteroid có thể làm giảm nồng độ selen trong huyết thanh.

QUẢ LIỆU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Chưa có ghi nhận về trường hợp quá liều.
Không nên dùng quá liều chỉ định.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc không gây buồn ngủ, không ảnh hưởng tới người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

BẢO QUẢN:

Trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

SDK: QLSP-938-16

ĐÉ THUỐC XA TÂM TAY TRẺ EM

2



Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI
Cụm công nghiệp Hà Bình Phượng, Thường Tín, Hà Nội




Tài liệu thông tin thuốc



18/5/2018



Enzicoba



Tài liệu này gồm có 02 trang

Thông tin chi tiết về sản phẩm xin xem ở trang 2

Số giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc của Bộ Y tế

...../XNTT/....., ngày....., tháng....., năm.....

Ngày in tài liệu:/...../.....



Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI
Cụm công nghiệp Hà Bình Phượng, Thường Tín, Hà Nội

1