

THUỐC KÊ ĐƠN  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG  
HỎI THẦY THUỐC ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN  
ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM.

## ORACORTIA

**Thành phần:** Trong 100 g chứa:

*Hoạt chất*

Triamcinolon acetonid.....0,10 g

*Tá dược:*

Natri carboxymethylcellulose, pectin, gelatin, mint oil (Dầu bạc hà), hydrocarbon gel

**Dạng bào chế:** Thuốc mỡ.

**Quy cách đóng gói**

- Túi nhôm 1 g. Hộp 24, 50 túi nhôm x 1 g.

- Tuýp nhôm 5 g, hộp nhỏ chứa 1 tuýp nhôm 5 g. Hộp lớn chứa 12 hộp nhỏ.

**Dược động học**

- Triamcinolon acetonid dùng tại chỗ được hấp thu qua da với tỷ lệ khác nhau phụ thuộc vào mức độ tổn thương.

- Triamcinolon được phân bố vào tất cả các mô trong cơ thể (cơ, gan, da, ruột, thận...). Thuốc qua được hàng rào nhau thai và tiết vào sữa một lượng nhỏ.

- Triamcinolon chuyển hoá chủ yếu ở gan, một phần ở thận, và bài xuất qua nước tiểu, nửa đời huyết tương là 2 - 5 giờ. Liên kết được với albumin huyết tương.

**Dược lực học**

- Triamcinolon acetonid là glucocorticoid tổng hợp có fluor. Triamcinolon acetonid dùng tại chỗ có tác dụng ngăn chặn hoặc làm giảm tiến triển của các triệu chứng viêm như rát, nóng đỏ, phồng rộp tại chỗ.

- Thuốc được hấp thu tốt khi dùng tại chỗ, đặc biệt khi băng kín hoặc khi da bị tổn thương. Khi dùng triamcinolon kéo dài, nên dùng liều lượng nhỏ nhất có thể.

**Chỉ định**

ORACORTIA được chỉ định điều trị hỗ trợ để làm giảm tạm thời các triệu chứng của viêm nhiễm khoang miệng hay tổn thương dạng loét do chấn thương.

## **Liều lượng & Cách dùng**

- Thuốc dùng ngoài.
- Bôi một lượng nhỏ lên vùng da bị tổn thương (không chà xát) để tạo ra một màng mỏng. Dùng ORACORTIA lúc đi ngủ để cho thuốc steroid tiếp xúc với vùng tổn thương suốt đêm. Nếu cần thiết, có thể dùng 2 - 3 lần/ngày, nên dùng sau khi ăn.

## **Chống chỉ định**

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Tổn thương do nhiễm nấm, bạch biến, herpes, khối u mới mọc, mụn trứng cá đỏ, loét hạch.

## **Thận trọng**

- Không dùng trên vùng da rộng hay lượng lớn trong thời gian dài.

**Phụ nữ có thai và cho con bú:** thận trọng khi sử dụng. Chỉ sử dụng corticoid tại chỗ cho phụ nữ có thai và cho con bú khi cân nhắc giữa lợi ích cho bệnh nhân và nguy cơ với thai nhi hoặc trẻ đang bú mẹ.

**Ảnh hưởng trên khả năng lái xe và vận hành máy móc:** Không.

**Tương tác thuốc:** Không có thông tin có ý nghĩa.

**Tác dụng không mong muốn**

Nói chung, ORACORTIA được dung nạp tốt. Tác dụng phụ tại chỗ của steroid như teo da, ban đỏ, rạn và làm mỏng da, rạn da có thể xuất hiện, đặc biệt ở vùng da có nhiều nếp gấp.

**Thông báo cho nhân viên y tế bất cứ tác dụng không mong muốn nào gặp phải trong quá trình sử dụng thuốc.**

**Sử dụng quá liều:** Không có thông tin có ý nghĩa.

**Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**Bảo quản:** Bảo quản ở nơi khô mát không quá 30°C.

**Tiêu chuẩn chất lượng:** TCCS.

**Nhà sản xuất:**

**Công ty TNHH THAI NAKORN PATANA (Việt Nam)**

636 Nguyễn Tất Thành - Phường 9 - TP. Tuy Hòa - Phú Yên - VN

**Nhà nhượng quyền:**

**Công ty TNHH THAI NAKORN PATANA (Thái Lan)**

Nonthaburi – Thái Lan