



Thuốc bán theo đơn

SPASTICON

Piracetam 400 mg + Cinarizin 25 mg

CÔNG THỨC: Mỗi viên nang cứng chứa

Piracetam	400 mg
Cinarizin	25 mg
Tá dược: (Natri laurylsulfat, avicel, talc, magnesi stearat, aerosil, sodium starch glycolat).....	v.d. 1 viên

TRÌNH BÀY: Viên nang cứng, chai 100 viên. Vỉ 10 viên, hộp 3 vỉ, hộp 06 vỉ.

CHỈ ĐỊNH:

- Bệnh não do chấn thương.
- Bệnh não do tổn thương thực thể hoặc nguyên nhân tâm lý gây rối loạn trí nhớ và chức năng nhận thức khác - hoặc rối loạn xúc cảm.
- Bệnh lý mè đao (chóng mặt, ù tai, buồn nôn, nôn, rung giật nhăn cầu).
- Hội chứng Ménière.
- Dự phòng và điều trị đau nửa đầu.
- Cải thiện quá trình nhận thức ở trẻ chậm phát triển trí não.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Suy thận nặng (hệ số thanh thải creatinin dưới 20 ml/phút).
- Người bệnh suy gan.
- Bệnh Huntington.
- Loạn chuyển hóa porphyrin.

THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

- Thận trọng khi dùng cho người suy thận. Cần theo dõi chức năng thận khi dùng cho người suy thận và người già. Cần điều chỉnh liều khi dùng cho người suy thận.
- Thận trọng khi dùng lâu dài ở người cao tuổi vì có thể xuất hiện các triệu chứng ngoại tháp trầm trọng hơn.

* Sử dụng cho phụ nữ cho con bú:

- Không được sử dụng cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái tàu xe và vận hành máy móc:

- Thuốc có thể gây ngủ gà nên thận trọng khi lái tàu xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG NGOẠI Ý:

* Thường gặp:

- Thần kinh trung ương: Ngủ gà, mất ngủ, bồn chồn, dễ kích động, nhức

đầu.

- Tiêu hóa: Rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng, trưởng bụng.

- Toàn thân: mệt mỏi.

*** Ít gặp:**

- Thần kinh trung ương: Nhức đầu, run, kích thích tình dục.

- Tiêu hóa: Khô miệng, tăng cân.

- Khác: Ra mồ hôi, phản ứng dị ứng, chóng mặt.

*** Hiếm gặp:**

- Thần kinh trung ương: Triệu chứng ngoại tháp ở người cao tuổi hoặc khi điều trị dài ngày.

- Tim mạch: Giảm huyết áp (liều cao).

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC VỚI THUỐC KHÁC:

- Cinarizin: Rượu (chất ức chế hệ thần kinh trung ương), thuốc chống trầm cảm ba vòng: Sử dụng đồng thời với cinarizin có thể làm tăng tác dụng an thần của mỗi thuốc nêu trên hoặc của cinarizin.

- Dùng đồng thời Piracetam và hormon tuyến giáp: xảy ra lú lẫn, bị kích thích và rối loạn giấc ngủ.

- Thời gian prothrombin lại tăng lên khi dùng đồng thời warfarin và piracetam.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Dùng đường uống. Không dùng quá 3 tháng.

- Dùng theo chỉ dẫn của thầy thuốc hoặc theo liều sau:

+ Người lớn: 1 – 2 viên x 3 lần/ngày, trong 1 – 3 tháng.

+ Trẻ em: 1 – 2 viên x 1 - 2 lần/ngày.

+ Suy thận nhẹ và vừa: giảm liều hoặc tăng khoảng cách liều.

SỬ DỤNG QUÁ LIỀU:

- Chưa có thông tin về sử dụng quá liều.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ.

BẢO QUẢN: NƠI KHÔ, NHIỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 30°C, TRÁNH ÁNH SÁNG.

ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

27 Nguyễn Chí Thanh - K.2 - P.9 - Tp. Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh

ĐT: (0294) 3753121, Fax: (0294) 3740239