



Bản vẽ hộp SUCRAHASAN( sucralfat 1g )

Hộp 30 gói thuốc bột  
Kích thước: 105 x 45 x 85



<https://vnras.com/drug/>



140 x 200 mm

Hướng dẫn sử dụng thuốc

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

## SUCRAHASAN

### Thuốc bột pha hỗn dịch uống

#### Thành phần

- Hoạt chất:** Sucralfat 1g.
- Tá dược:** Lactose monohydrat, Tinh bột ngô, Kollidon K30.

#### Được lực học

- Sucralfat là một muối nhôm của sulfat disaccharid, dùng điều trị loét dạ dày.
- Có chế tác dụng của thuốc là tạo một phức hợp với các chất như albumin và fibrinogen của dịch vị kết dính với ổ loét, làm thành một hàng rào ngăn cản tác động của acid, pepsin và mật. Sucralfat cũng gắn trên niêm mạc bình thường của dạ dày và tá tràng với nồng độ thấp hơn nhiều so với vị trí loét. Sucralfat còn có tác dụng đóng cửa pepsin, gắn với muối mật, làm tăng sản xuất prostaglandin E2 và dịch nhầy dạ dày.

#### Được dùng học

- Có tới 5% phần disaccharid và dưới 0,02% nhôm được hấp thu vào cơ thể sau khi uống một liều Sucralfat.
- Phần lớn thuốc được đào thải ra phân, chỉ có một lượng nhỏ thải ra nước tiểu.

#### Chỉ định

- Thuốc được dùng trong các trường hợp:
- Loét dạ dày – tá tràng, viêm dạ dày mạn tính, loét lành tính.
  - Phòng ngừa tái phát loét tá tràng, loét do stress.
  - Chỉ định trong trường hợp trào ngược dạ dày – thực quản.

#### Chống chỉ định

- Quá mẫn với Sucralfat hay với bất cứ thành phần nào của thuốc.

#### Liều lượng

- Liều lượng và thời gian dùng thuốc do bác sĩ điều trị quyết định. Tác dụng bảo vệ tại chỗ của Sucralfat chỉ đạt được nếu dùng đều đặn theo chỉ định của bác sĩ.
- Điều trị loét dạ dày – tá tràng
  - Liều thông thường: 1 gói x 4 lần/ngày, uống trước bữa ăn và trước khi đi ngủ; hay 2 gói x 2 lần/ngày, uống trước bữa ăn sáng và trước khi đi ngủ.
  - Mỗi đợt điều trị thường kéo dài từ 4 – 8 tuần tùy theo mức độ loét cho đến khi hết quá nội soi hay X-quang cho thấy vết loét lành hẳn. Tuy nhiên, nếu cần thiết, đợt điều trị có thể kéo dài hơn nhưng không nên dùng quá 2 tuần.
  - Đợt điều trị hiệu quả thường phối hợp Sucrahasan với thuốc ức chế histamin H2 hay ức chế bom proton và các kháng sinh:
    - Phòng ngừa tái phát loét dạ dày – tá tràng
    - Liều thông thường: 1 gói x 2 lần/ngày
    - Điều trị không kéo dài quá 6 tháng.
- Nên phối hợp Sucrahasan với kháng sinh để loại trừ yếu tố gây tái phát là vi khuẩn *Helicobacter pylori*.
- Điều trị trào ngược dạ dày – thực quản
  - Liều thông thường: 1 gói x 4 lần/ngày uống trước mỗi bữa ăn chính và trước khi đi ngủ.
  - Trẻ em trên 4 tuổi
    - 40 – 80 mg/kg cân nặng/ngày chia làm 4 lần (uống 1 giờ trước mỗi bữa ăn và trước khi đi ngủ).

#### Cách dùng

- Uống Sucrahasan khi dạ dày trống (khoảng nửa giờ hay 1 giờ trước khi ăn).

- Hòa 1 gói Sucrahasan vào nửa ly nước tạo thành hỗn dịch đồng nhất trước khi uống.

#### Tác dụng phụ

- Phổ biến nhất là chứng táo bón.
- Hiếm gặp các triệu chứng rối loạn về tiêu hóa như buồn nôn, đầy hơi, khó tiêu, khó miệng; và các triệu chứng về thần kinh như hoa mắt, nhức đầu, chóng mặt, đau lưng, mất ngủ, buồn ngủ.
- Hiếm khi gặp các phản ứng quá mẫn như nổi mề đay, ngứa, phù, viêm mũi, co thắt thanh quản...

#### Tương tác thuốc

- Không dùng thuốc antacid cùng lúc với Sucrahasan vì antacid có thể ảnh hưởng đến sự bám của Sucralfat trên niêm mạc. Nên uống cách xa nhau khoảng 1/2 giờ.
- Sucralfat có thể làm giảm sự hấp thu của một số thuốc cimetidine, ranitidine, ciprofloxacin, norfloxacin, ofloxacin, digoxin, warfarin, phenytoin, theophyllin, tetracycline... Nên uống cách xa nhau khoảng 2 giờ.
- Sucralfat có thể gắn kết với protein trong thức ăn hay trong một số thuốc khác. Những bệnh nhân được nuôi dưỡng bằng ống thông dạ dày nên dùng thuốc này một cách riêng biệt với thức ăn và các thuốc khác.

#### Thận trọng

- Một lượng nhỏ nhôm chứa trong Sucralfat có thể được hấp thu qua đường tiêu hóa và sẽ được thải trừ qua thận.
- Nguy cơ tích lũy nhôm xảy ra ở người bị suy thận nặng hay đang sử dụng đồng thời với các thuốc chứa nhôm khác.

#### Trẻ em dưới 4 tuổi

#### Quá liều và cách xử trí

Chưa có báo cáo về các trường hợp quá liều. Trong trường hợp này, cần cố gắng bắc sít hoặc đến bệnh viện gần nhất.

#### Phụ nữ có thai và cho con bú

Không chống chỉ định nhưng hạn chế sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

#### Tác động của thuốc khi vận hành tàu xe, máy móc

Cẩn thận trong khi dùng thuốc cho những người lái tàu, xe, vận hành máy móc, thiết bị, vì thuốc có thể gây hoa mắt, chóng mặt hoặc buồn ngủ đối với một số người.

Trình bày: Hộp 30 gói x gói 2 g. Gói giấy/AIPE.

Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C, tránh ẩm.

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

#### Lưu ý

Không dùng thuốc quá liều chỉ định.

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng ghi trên bao bì.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.



CÔNG TY TNHH HASAN - DERMAPHARM  
Đường số 2 - Khu công nghiệp Đồng An,  
Bình Dương, Việt Nam

#### Để thuốc xa tầm tay của trẻ em

