

DẦU GỘI ĐẦU

GMP - WHO

Tài liệu dành cho nhân viên y tế

Lưu hành nội bộ

# SHAMPOO CICLOPIROX

Ciclopirox 1% kl/tt



**TRỊ GÀU VÀ NẤM DA ĐẦU HIỆU QUẢ**



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VCP

Số đăng ký: VD - 33644 - 19

## Hướng dẫn sử dụng thuốc

### SHAMPOO CICLOPIROX

Ciclopirox 1% kl/tt



**1. QUY CÁCH:** Hộp 01 lọ shampoo 100ml và tờ hướng dẫn sử dụng.

**2. THÀNH PHẦN CẤU TẠO:** 100 ml Shampoo Ciclopirox có chứa:

Ciclopirox: 1,0 g

Tá dược (*Dinatri laureth sulfosuccinat, Cocamidopropyl betain, Natri lauroth sulfat, Acid citric, Natri clorid, Natri benzoat, Nước tinh khiết*) vừa đủ: 1,0 g

**3. ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC:**

Ciclopirox là thuốc chống nấm tại chỗ.

Cơ chế tác dụng của Ciclopirox là tạo phức chelat với các ion đa hóa trị ( $Fe^{+3}$  hoặc  $Al^{+3}$ ), dẫn đến sự ức chế các enzym phụ thuộc ion kim loại mà chịu trách nhiệm về sự thoái hóa peroxit trong tế bào nấm, dẫn đến tiêu hủy tế bào nấm.

*In vitro*, Ciclopirox có hoạt tính kháng nấm trên các chủng *Malassezia furfur* (*Pityrosporum spp.*), *P. ovale*, và *P. orbiculare* ...

**4. CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG – CÁCH DÙNG & CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

**4.1. Chỉ định:** Shampoo Ciclopirox dùng để điều trị cho bệnh viêm da tiết bã ở da đầu người lớn.

**4.2. Cách dùng – Liều dùng:**

Dùng gội đầu, không cho lên niêm mạc mắt, miệng, âm đạo. Nếu rây lên các niêm mạc này, rửa lại với nước sạch. Không được nuốt.

Người lớn, người già và trẻ em trên 16 tuổi:

Làm ướt tóc và da đầu. Cho 5 – 10 ml cho lên da đầu, thoa đều và giữ nguyên khoảng 3 phút. Sau 3 phút, gội lại với nước để làm sạch tóc và da đầu.

Dùng 2 lần/tuần – trong 4 tuần. Nên gội cách 3 ngày một lần.

Sau 4 tuần, tình trạng không được cải thiện: chẩn đoán lại.

**4.3. Chống chỉ định:** Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

**5. THẨM TRỌNG:**

Dùng gội đầu, không cho lên niêm mạc mắt, miệng, âm đạo. Nếu rây lên các niêm mạc này, rửa lại với nước sạch. Không được nuốt.

Nếu có kích ứng hoặc mẫn cảm khi dùng thuốc, cần cho bệnh nhân ngừng thuốc và điều trị thích hợp.

Phải điều trị thuốc đủ thời gian mặc dù triệu chứng có thuyên giảm. Sau 4 tuần điều trị, nếu không có tiến triển thì cần chẩn đoán lại.

**6. SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:**

**Phụ nữ có thai:** Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

**Phụ nữ cho con bú:** Thuốc ít hấp thu toàn thân, do vậy lượng thuốc bài xuất vào sữa mẹ không đáng kể và không gây ảnh hưởng trên trẻ bú mẹ. Ciclopirox có thể được sử dụng ở phụ nữ đang cho con bú, tuy nhiên cần thận trọng trước khi sử dụng.

**7. ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:** Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

**8. TƯƠNG TÁC THUỐC:**

Không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc. Tuy nhiên, không dùng lẫn shampoo Ciclopirox với các thuốc điều trị viêm da tiết bã da đầu khác.

**9. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN (ADR):**

Thường gặp: Bong nhẹ, ngứa, mẩn đỏ vùng da bôi thuốc.

Tác dụng không mong muốn khác: đổi màu tóc, rụng tóc, kích ứng, phát ban.

**10. QUÁ LIỆU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:**

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc. Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời. Khi vô tình nuốt phải thuốc cần được xử trí kịp thời như rửa dạ dày hoặc sử dụng các biện pháp hỗ trợ nếu phù hợp.

**11. BẢO QUẢN**

Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. Vứt bỏ phần thuốc không sử dụng khi đã điều trị xong.

**12. HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất

**Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì.**