

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

FERITONIC

BỔ SUNG SẮT VÀ GIẢM NGUY CƠ THIẾU MÁU DO THIẾU SẮT

Sắt rất cần thiết cho sự sống, sắt đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp hemoglobin (là thành phần cơ bản của hồng cầu), myoglobin và một số enzym chuyển hóa khác. Thiếu sắt là nguyên nhân chủ yếu gây thiếu máu. Người thiếu máu do thiếu sắt thường có các biểu hiện: xanh xao, mệt mỏi, chóng mặt, niêm mạc nhợt nhạt.

Feritonic với thành phần chính Ferric hydroxide polymaltose (Fe+++), khi vào cơ thể giải phóng sắt từ từ, đáp ứng nhu cầu sắt của cơ thể.

Feritonic với công thức được nghiên cứu tạo mùi vị dễ uống, không có vị tanh thường thấy của sắt, ít ảnh hưởng tới dạ dày, ít gây táo bón.

Feritonic không chứa chất bảo quản, an toàn khi sử dụng cho trẻ em, phụ nữ có thai và cho con bú.

TRÌNH BÀY: Hộp 2 vỉ x 10 ống uống x 10 ml.

THÀNH PHẦN: Mỗi ống 10 ml chứa:

Sắt (dạng Ferric hydroxide polymaltose).....40 mg
Các thành phần nguyên liệu, phụ gia khác: Nước tinh khiết, Đường trắng, Ethyl vanillin (tổng hợp), Dầu chuối (tổng hợp), Chất điều chỉnh độ acid (INS 524 hoặc INS 507)vừa đủ

CÔNG DỤNG:

Bổ sung sắt, hỗ trợ: tái tạo hồng cầu, giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

- Người thiếu máu do thiếu sắt: người bệnh sau phẫu thuật, người mới ốm dậy, suy dinh dưỡng, người gầy yếu, xanh xao, mệt mỏi, ăn kém.
- Người trong giai đoạn nhu cầu sắt tăng cao: phụ nữ có thai, đang thời kỳ cho con bú, trẻ em, thanh thiếu niên trong thời kỳ tăng trưởng.
- Người mất máu do chấn thương và trong một số bệnh đường tiêu hóa, mất máu trong thời kỳ kinh nguyệt, rong kinh.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- Liều dùng: trẻ em và người lớn uống 1 ống/ngày. Trẻ dưới 2 tuổi nên dùng theo hướng dẫn của thầy thuốc.
- Thời gian sử dụng 1 - 3 tháng tùy vào mức độ thiếu sắt cũng như đáp ứng của người sử dụng hoặc theo lời khuyên, chỉ dẫn của thầy thuốc.

*** Lưu ý:**

- Không dùng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

- Để hấp thu sắt tối đa nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, khi sử dụng

Feritonic nên:

+ Tránh uống cùng lúc với nước trà vì ức chế hấp thu sắt.

+ Uống cùng với vitamin C giúp làm tăng hấp thu sắt.

- Không dùng sản phẩm khi ống không còn nguyên vẹn; bị nứt, gãy hoặc có dấu hiệu khác thường.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh đổ vỡ.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

HƯỚNG DẪN CÁCH BÈ ỐNG THUỐC



Miếng nhựa dùng để bẻ đầu ống



Cầm nghiêng ống, kẹp miếng nhựa để bẻ đầu ống thứ nhất.



Kẹp miếng nhựa để bẻ đầu ống tiếp theo, dung dịch sẽ chảy vào ly.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ

Traphaco

Sản phẩm của: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại liên hệ: **18006612**

Sản xuất tại: **CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO**

Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên

CNC33TNT106TPBVSK