

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 08/10/2014

Mẫu gói: Sorbitol STADA 5g
Kích thước: 50x82 mm
Tỉ lệ: 100%

<p>Sorbitol STADA 5g THUỐC BỘT / POWDER</p> <p>Thành phần: Mỗi gói chứa: Sorbitol 5 g</p> <p>Chỉ định, Cách dùng, Chống chỉ định và các thông tin khác: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. Bảo quản: Trong bao bì kín, nơi khô, tránh ánh sáng. Nhiệt độ không quá 30°C. Tiêu chuẩn áp dụng: T.CNSX ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG</p> <p>Composition: Each sachet contains: Sorbitol 5 g</p> <p>Indications, Administration, Contraindications and other precautions: Read the leaflet inside. Store in a well-closed container, in a dry place, protect from light. Do not store above 30°C. Manufacturer's specification KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN READ THE PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE</p> <p><small>PH000713</small></p> <p><small>CTY TNHH LD STADA-VIỆT NAM (STADA-VN) V.V. Co., Ltd. K6/3/1 Nguyễn Thị Sóc, Ấp Mỹ Hòa 2, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Số lô SX - Batch No. / NSX - Mfg. date / HD - Exp. date</small></p>	<p>Sorbitol STADA 5g THUỐC BỘT / POWDER</p>   <p>Gói 5g / sachet 5g</p> 
--	--

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Phan Huy

STADA

THUỐC BỘT / POWDER

Sorbitol STADA 5g

20 gói / 20 sachets

Mẫu hộp: Sorbitol STADA 5g
Kích thước: 85x110x52 mm
Tỉ lệ: 81%

Sorbitol STADA 5g

THUỐC BỘT



HỘP 20 GÓI



STADA

Sorbitol STADA 5g

THUỐC BỘT

Thành phần: Mỗi gói 5g chứa:
Sorbitol 5 g
Chỉ định, Cách dùng, Chống chỉ định và các thông tin khác:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.
Bảo quản: Trong bao bì kín, nơi khô, tránh ánh sáng. Nhiệt độ không quá 30°C.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCNSX
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Barcode

CTY TNHH ID STADA-VIỆT NAM
86/31 Nguyễn Thị Sơn, Ấp Mỹ Hòa 2, Xã Xuân Thọ 2, Huyện Lạc Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

85x110x52

Sorbitol STADA 5g

POWDER

Composition: Each sachet of 5g contains:
Sorbitol 5 g
Indications, Administration, Contraindications and other precautions:
Read the leaflet inside.
Store in a well-losed container, in a dry place, protect from light. Do not store above 30°C.
Manufacturer's specification
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ THE PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE

SDK - Reg. No.:
SỐ 16 SX - batch No. / NSX - Mfg. date / HD - Exp. date:

STADA-VN JOINT VENTURE CO., LTD.
86/31 Nguyễn Thị Sơn, Ấp Mỹ Hòa 2, Xã Xuân Thọ 2, Huyện Lạc Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

PL020713

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
LIÊN DOANH
STADA-VIỆT NAM



DS. Phan Huy

Sorbitol STADA 5 g

THÀNH PHẦN

Mỗi gói chứa:
Sorbitol..... 5,0 g

MÔ TẢ

Bột kết tinh trắng, không mùi, vị ngọt.

DƯỢC LỰC HỌC

Sorbitol (D-glucitol) là một rượu có nhiều nhóm hydroxyl. Thuốc thúc đẩy sự hydrat hoá các chất chứa trong ruột. Sorbitol kích thích tiết cholecystokinin-pancreozymin và tăng nhu động ruột nhờ tác dụng nhuận tràng thẩm thấu.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Sorbitol được hấp thu kém qua đường tiêu hóa sau khi uống. Thuốc được chuyển hóa chủ yếu qua gan thành fructose, một phần ứng được xúc tác bởi men sorbitol dehydrogenase. Một số sorbitol có thể chuyển đổi trực tiếp thành glucose nhờ men aldose reductase. Một phần rất nhỏ sorbitol không chuyển hóa được đào thải qua thận. Phần còn lại đào thải dưới dạng CO₂ khi thở ra trong quá trình hô hấp.

CHỈ ĐỊNH

Thuốc được dùng trong điều trị triệu chứng khó tiêu và táo bón.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Cách dùng

Chỉ được dùng các thuốc nhuận tràng thẩm thấu với liều đơn và không thường xuyên.

Sorbitol STADA 5 g được dùng bằng đường uống. Hòa tan 1 gói thuốc trong nửa ly nước, uống trước bữa ăn khoảng 10 phút.

Liều lượng

- Điều trị triệu chứng khó tiêu: Người lớn dùng 1 đến 3 gói mỗi ngày trước bữa ăn hoặc khi bị khó tiêu
- Điều trị táo bón: Người lớn dùng 1 gói lúc bụng đói vào buổi sáng. Trẻ em dùng ½ liều người lớn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Sorbitol chống chỉ định trong các bệnh sau:

- Bệnh thực thể viêm ruột non, viêm loét đại - trực tràng, bệnh Crohn và hội chứng tắc hay bán tắc.
- Hội chứng đau bụng chưa rõ nguyên nhân.
- Người bệnh không dung nạp fructose do di truyền (một bệnh về chuyển hóa hiếm gặp).

THẬN TRỌNG

- Không nên dùng kéo dài các thuốc nhuận tràng.
- Điều trị táo bón bằng sorbitol chỉ để hỗ trợ cho cách điều trị bằng chế độ ăn uống.
- Không dùng thuốc trong trường hợp bị tắc đường dẫn mật.
- Ở người bệnh đại tràng kích thích, tránh dùng thuốc khi đói và nên giảm liều.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Do làm tăng nhu động ruột, mọi thuốc nhuận tràng có thể rút ngắn thời gian di chuyển của các thuốc uống cùng, do đó làm giảm sự hấp thu của những thuốc này.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Chưa biết.

TÁC DỤNG PHỤ

Có thể gây tiêu chảy và đau bụng, đặc biệt ở những bệnh nhân bị chứng đại tràng kích thích hay trường bụng. Ngừng dùng thuốc khi xảy ra bất kỳ phản ứng phụ nào.

QUÁ LIỀU

Rối loạn nước và điện giải nếu dùng liều cao lặp lại. Việc cân bằng nước và điện giải phải được theo dõi chặt chẽ.

- BẢO QUẢN** : Trong bao bì kín, nơi khô, tránh ánh sáng. Nhiệt độ không quá 30°C.
- HẠN DÙNG** : 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- ĐÓNG GÓI** : Gói 5 g. Hộp 20 gói.
- TIÊU CHUẨN** : Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

*Đề xa tầm tay trẻ em
Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc*

Ngày duyệt lại nội dung toa: 01/08/2013

STADA

CTY TNHH LD STADA-VIỆT NAM

K63/1 Nguyễn Thị Sóc, Ấp Mỹ Hòa 2,
Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn,
Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel: (84).8.37181154 - 37182141 • Fax: (84).8.37182140

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PT. TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Phan Huy