




Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế

COLDFLU Forte

Acetaminophen 500mg, Dextromethorphan HBr 15mg, Loratadin 5mg



Giảm các triệu chứng cảm, cúm, ho.



Handwritten signature and date: 6/12/12



Giảm các triệu chứng
cảm, cúm, ho.

Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế

COLDFLU Forte

Acetaminophen 500mg, Dextrómethorphan HBr 15mg, Loratadin 5mg

Thành phần: Mỗi viên nén dai bao phim chứa

Acetaminophen500mg

Dextromethorphan15mg

Loratadin5mg

Tá dược: tinh bột ngô, Mycrocrystalline, cellulose, PVP, Natri starch, glycolat, Magnesi sterat, HPMC, PEG 6000, Tal, Titan dioxyd, Indigo carmine lake.

Chỉ định: Thuốc được chỉ định làm giảm các triệu chứng nghẹt mũi, chảy nước mũi, chảy nước mắt, ngứa mắt, viêm xoang có kèm ho và sốt (hoặc nhức đầu, đau nhức bắp thịt) trong cảm cúm.

Liều dùng & cách sử dụng:

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống 1 viên x 2 lần/ngày.

Bệnh nhân suy gan, suy thận: uống 1 viên mỗi ngày hoặc uống cách ngày.

Thận trọng:

- Nếu đau và sốt không giảm, hoặc xảy ra triệu chứng mới (nổi mẩn đỏ và sưng phồng ngoài da...) cần ngưng thuốc và hỏi ý kiến thầy thuốc.

- Nếu ho kéo dài một hơn tuần hay đau họng kéo dài hơn hai ngày và kèm theo sốt, đau đầu, nổi mẩn, nôn... cần ngưng thuốc và hỏi ý kiến thầy thuốc.

- Thận trọng sử dụng thuốc ở bệnh nhân uống rượu.

- Trong các trường hợp do mạn tính và ho kéo dài, ho do hút thuốc, ho có nhiều đàm, phải hỏi ý kiến thầy thuốc trước khi dùng thuốc.

- Không dùng chung với các sản phẩm có chứa acetaminophen, loratadin và dextromethorphan khác.

- Không dùng thuốc lâu quá 7 ngày.

Phụ nữ có thai và cho con bú:

Không nên sử dụng cho phụ nữ có thai và phụ nữ đang cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Không nên sử dụng thuốc khi lái xe và vận hành máy móc.

Chống chỉ định: trẻ em dưới 6 tuổi, bệnh nhân dị ứng với các thành phần của thuốc.

Bệnh ho ở bệnh nhân hen, suy hô hấp, glaucoma, phì đại tiền liệt tuyến, bít cổ bàng quang. Bệnh nhân suy gan, suy thận.

Bệnh tim mạch trầm trọng.

Bệnh nhân đang dùng các thuốc IMAO.

Tương tác thuốc:

Acetaminophen làm tăng tác dụng của thuốc kháng đông (wafarin).

Rượu, thuốc chống co giật (phenytoin, barbiturat, carbamazepin) và insoniazid có thể làm tăng độc tính acetaminophen đối với gan.

Cimetidin, ketokonazol, erythromycin làm tăng nồng độ của loratadin trong huyết tương.

Dextromethorphan làm tăng tác dụng của thuốc ức chế thần kinh trung ương.

Quinidin làm tăng nồng độ trong huyết thanh và tác dụng của dextromethorphan.

Tác dụng ngoại ý:

Acetaminophen: dùng liều điều trị không gây tác dụng phụ đáng kể. Ban da và những sản phẩm dị ứng khác thỉnh thoảng xảy ra.

Dextromethorphan HBr: có thể gây mệt mỏi, chóng mặt, nhịp tim nhanh, buồn nôn, đỏ bừng. Ít khi gặp nổi mề đay. Hiếm khi gặp ngoại ban da.

Loratadin: có thể gặp đau đầu, khô miệng. Ít khi gặp chóng mặt, khô mũi và hắt hơi, viêm kết mạc. Hiếm khi gặp trầm cảm, tim đập nhanh, loạn nhịp nhanh trên thất, đánh trống ngực, buồn nôn, chướng gan bất bình thường, kinh nguyệt không đều, ngoại ban, nổi mề đay và choáng phần vệ.

Hạn dùng: 36 tháng, kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: nơi khô, mát (dưới 30°C). Tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS

Trình bày: Hộp 50 vỉ, vỉ 4 viên.



S. Nglessey
6/12/12

Đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

