

ថ្នាំប្រយោជន៍ប្រជាជន

មានសារជាតិថ្នាំចិនសែ ៩ ប្រភេទ ថ្នាំចូលរួម ៩ ប្រភេទ

១. ប្រភេទពិសេស : ថ្នាំនេះអាចព្យាបាលគ្រប់វិធានគ្រប់ជំងឺទូទៅ ជំងឺដែលអស់មធ្យោបាយព្យាបាលនោះក៏អាចជាសះស្បើយបានដែរ

២. ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ : ជួយសំរួលសរសៃឈាមអោយរត់បានលឿន បំបាត់ឈាមឈាមរដូវក៏បានល្អ ផ្សះផ្សា ធ្លាក់សរ ក្តៅទ្រូង ក្តៅសាច់ គ្រុនផ្តាសាយ អាសែកប្បិរលាកច្រមុះ ហ្វេរូសំបោរ ឈឺចំពងករ ឈឺក្បាល វិលមុខ ក្លែងក្លាំងស្មារតី ជំនួយខ្សាញ់ឱ្យមានការចងចាំបានល្អ ឈឺចុកចាប់ក្នុងខ្លួន សប្បសារ ពារកាយ ហើមសន្លាក់ដៃ ជើង ស្លឹកក្រហាយ ផ្តោះគ្រុច ហោយដៃជើង ចុកចង្កេះ ទល់ខ្យល់ ឆ្កែចោះ ក្រពះ និងឈាមកដើរបានល្អលឿន បេះដូងខ្សោយ ណែនទ្រូង លើសឈាម ហិតហត់ ក្អក ស្នូមរឹងរី ទាស់គ្រប់មុខ សាច់ឈាមស្លេកស្លាំង ពិសារមិនសូវបាន សំរាន្តមិនសូវលក់ ខ្សោយសរសៃប្រសាទ ហ៊ឹងត្រចៀក ។

៣. ជាពិសេសទៀត : ជួយកំលាំងអោយមាំមួន សាច់ឈាមក្តីថ្លាវ្លា កំចាត់ប្លូស្តូស្តាតដែលដុះឱ្យអោយរូញរាត់ ស្វាយក្រាប ប្រមេះមីកបាយ តាអាកមរមាស់ រើម ជំងឺសើរស្បែក គ្រប់ប្រភេទ ។

៤. ប្រើប្រាស់បាន : មនុស្សពេញវ័យឡើងទាំងបុរសស្ត្រី ពិសារមួយថ្ងៃពីរដងព្រឹក២គ្រាប់ ល្ងាច២គ្រាប់ បើចំពោះកូនក្មេង១០ឆ្នាំឡើងអោយព្យាបាល១គ្រាប់ព្រឹក ១គ្រាប់ល្ងាច ។ ចំពោះអាយុមត់ពិសារជាមួយមីកដុះក្តៅស៊ីនៗ ឬមីកបរិសុទ្ធពិសារនៅក្រោយពេលបាយ ថ្នាំនេះជួយអោយវិលមាហារ ។

-សូមបញ្ជាក់ : បើចំពោះអ្នកជំងឺណា ឈឺរាង រាងស្នូមពិសារថ្នាំនេះរយៈពេល១ខែ បើបានស្បើយហើយ សូមបន្តយកពិសារនៅ១គ្រាប់ព្រឹក ១គ្រាប់ល្ងាច ក្នុងរយៈពេល៣០ថ្ងៃ សូមផ្អាកពិសារថ្នាំ ។ បើនៅថ្ងៃក្រោយជំងឺបើឡើងវិញសូមពិសារថ្នាំនេះបន្តទៅទៀត ។

៥. ហាមប្រើ : ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ប្រា ។

បានយើងលិខិតអនុញ្ញាតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ២៦១ អ.ប.ស

គំនិតចំណាំ : មកជាវដល់ជូនមានថ្នាំលក់ជូនគ្រប់មុខដល់អ្នកជំងឺ

នៅត្រើយម្ខាងខាងកើតកោះពេជ្រ ហាមបោះពុម្ពចម្លង

100年人參
TANG BUN BAN
100 Years of Ginseng
992414343

សញ្ញារូប អមប្រា
អាសយដ្ឋាន: ភូមិពោធិ៍ ឃុំស្វាយជ្រៃ ស្រុកទន្សាយក្រវាត់ ខេត្តកណ្តាល
ទល់មុខជ្រោយចង្វារត្រើយម្ខាងខាងកើតជួរមាត់ចន្លេចេតុង

ផ្សែងផ្សែង

SPECIAL KHMER HERBAL MEDICINE

Composed of Nine Kind of Chinese Herbs and Nine Kinds of Khmer Herbs

1. Particulars: This herbal medicine is suitable for treating all kinds of diseases and patients of any age for any disease for which there is no specific medicine.

2. Main indications: Improving blood circulation; relieving pain; and menstruation; healing wounds; vaginal discharge, cardialgia, fever, colds, allergies, headache, Amnesia (Forgetfulness), dizziness, pain in all limbs, irritating numbness in the limbs, pain in the waist, gastritis, bowel movement disorder, emaciation, all types of eclampsia, insomnia, poor functioning of the nervous system, tinnitus (ringing in the ears).

3. Additional qualities: Improving physical strength; revitalizing skin texture; eradicating hemorrhoids; treating latent syphilis, gonorrhoea, eczema, itchy blisters, herpes and all kinds of skin diseases.

4. Dose: - Adults: twice daily - 2 tablets in the morning and 2 tablets in the evening.
- Children aged 10 years and older: twice daily - 1 tablet in the morning and 1 tablet in the evening.

The medicine should be taken with warm or bottled water after a meal.

5. Contraindication: Pregnant women should not take this medicine.



THUỐC CỔ TRUYỀN KHMER ĐẶC BIỆT

CƠ THÀNH PHẦN 9 VỊ THUỐC BẮC VÀ 9 VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN KHMER

1- Đặc điểm : Thuốc này có thể điều trị bá bệnh , cũng có thể trị hết các bệnh nang y .

2- Hiệu nghiệm : Giúp thư giãn điều hòa mạch máu , điều hòa kinh nguyệt , trị viêm tử cung, huyết trắng, nóng ngực , người nhiệt, cảm cúm, Viêm, viêm mũi, chảy nước mũi, viêm họng, đau nhức toàn thân, viêm khớp tay chân, tê thấp, trật gân, bong gân, mỏi chân tay, nhức lưng, trúng gió, tức bụng, bao tử, và nhậu trường, yếu tim, nặng ngực, cao huyết áp, óm o, bị trúng , nước da tái mét, ăn không đặng, mất ngủ, yếu dây thần kinh, ù tai .

3-Đặc biệt thêm : Tăng cường sinh lực, thịt da hồng hào, tiêu diệt trị ngoại mục nhỏ cho teo đi , bệnh da liễu , giang mai , hột soài, ngứa , dôi ăn, và các loại bệnh ngoài da khác .

4- Cách dùng : Người lớn cả đàn ông-đàn bà uống 01 ngày/02 lần, sang 02 viên, chiều 02 viên. Nếu trẻ em từ 10 tuổi trở lên uống sáng 01 viên, chiều 01 viên. Nhai cho nhuyễn rồi uống với nước chín ấm ấm, hoặc nước sôi sau bữa cơm. Thuốc này giúp cho tiêu hóa tốt.

Xin chú ý : Đối với người bệnh kinh niên, xin dùng thuốc này 01 Tháng sẽ khỏi bệnh, rồi uống giảm xuống : Sáng 01 viên, chiều 01 viên trong thời hạn 30 ngày, rồi ngưng uống thuốc.

Nếu ngày sau có tái bệnh lại, sẽ uống thuốc này tiếp tục.

