

HUPAVIR

TCA 50

Acid trichloroacetic
Acid glycolic
Chiết xuất tía tô

Mô tả:

Công thức của dung dịch HUPAVIR TCA 50 dựa trên sự kết hợp các thành phần đặc hiệu để sử dụng loại bỏ mụn cóc, mụn cơm, mụn sùi, mụn sinh dục (sùi mào gà, gai sinh dục), mụn thịt, chai chân hiệu quả

Hỗn hợp hoạt động với đa cơ chế:

1. Tẩy tế bào sừng: ở lớp trên cùng tạo thành mô sẹo của mụn cóc, mụn cơm, mụn sùi. Điều này cho phép làm mềm da cứng (Hoạt chất Acid glycolic)
2. Lột sâu mô: tạo thành mụn cóc hoặc mụn cơm, mụn sùi (Hoạt chất TCA)
3. Đào thải virus: Chiết xuất tự nhiên từ tía tô, trà xanh có tác dụng thẩm sâu và đào thải virus bao gồm các loại virus HPVs (*Human papiloma viruses*)

Thành phần: Acid trichloroacetic, Acid glycolic, chiết xuất tía tô, chiết xuất trà xanh, phụ liệu vừa đủ

Mục đích sử dụng:

Hỗ trợ làm giảm tình trạng mụn cơm, mụn cóc tay chân, chai chân, mụn cóc ở cổ, lưng, mụn sùi mào gà, mụn cóc sinh dục, gai sinh dục (âm đạo, cổ tử cung, hậu môn và các vị trí vùng kín khác). Phù hợp cho các loại mụn sùi có kích thước lớn, hoặc mụn sùi lâu ngày

Đối tượng sử dụng:

Dùng cho cả nam và nữ bị mụn cơm, mụn cóc, chai chân, mụn sùi trên da hoặc mụn sùi sinh dục (Sùi mào gà ở nam giới, gai sinh dục ở nữ giới) do HPV (Human papiloma virus) hoặc các loại virus khác gây ra

Sử dụng được cho trẻ em từ 4 tuổi trở lên dưới sự giám sát chặt chẽ của người lớn

Hướng dẫn sử dụng:

Đối với người bị mụn cóc, mụn cơm ở tay, chân, chai chân...

B1: Trước khi bôi HUPAVIR TCA 50, cần rửa sạch và sát trùng khu vực da bị bệnh bằng dung dịch nước muối sinh lý hoặc cồn 70 độ. Sau đó dùng bông lau sạch khô khu vực bị bệnh

B2: Dùng tăm bông lấy 1 lượng kem Vaselin màu xanh, bôi thành 1 lớp kem mỏng vào vùng da lành xung quanh chân nốt sùi (cần thận không bôi lên nốt sùi)

B3: Tháo bỏ nút nhỏ giọt màu trắng bên trong cổ chai. Dùng tăm bông nhúng dung dịch bôi chấm nhẹ lên vị trí da bị bệnh (bôi chấm dung dịch làm sao để bề mặt da bị bệnh phải được thấm đều dung dịch), chờ khoảng 1 phút để dung dịch được thẩm sâu. Mỗi ngày bôi 1 lần, (đối với nốt sùi to hoặc sừng hóa nhiều) hoặc cách ngày 1 lần (đối với nốt sùi bé), tăm bông chỉ được dùng 1 lần.

Sau 3-5 ngày bôi dung dịch, sẽ thấy xuất hiện ở vị trí bị bệnh có vết sùi màu vàng trắng, mụn se lại (là dấu hiệu phần chai mụn đang dần bị đào thải). Tiếp tục bôi dung dịch đúng theo hướng dẫn trên từ 7-10 ngày hoặc nhiều ngày hơn (tùy thuộc vào mụn to hay bé). Khi thấy hiện tượng mụn hoặc chai sừng đã bong tróc, có thể cạy nhẹ nhàng và bóc mụn ra. Nếu chân mụn vẫn còn thì tiếp tục bôi dung dịch đúng theo hướng dẫn cho tới khi chúng biến mất hoàn toàn.

Đối với người bị sùi mào gà, gai sinh dục ở vùng hậu môn,

vùng sinh dục

B1: Trước khi bôi HUPAVIR TCA 50, cần rửa sạch và sát trùng khu vực da bị bệnh bằng dung dịch nước muối sinh lý hoặc cồn 70 độ. Sau đó dùng bông lau sạch khô khu vực bị bệnh

B2: Dùng tăm bông lấy 1 lượng kem Vaselin màu xanh, bôi thành 1 lớp kem mỏng vào vùng da lành xung quanh chân nốt sùi (cần thận không bôi lên nốt sùi)

B3: Dùng tăm bông chấm phớt rất ít dung dịch HUPAVIR TCA 50 (hơi ướt đầu tăm bông rồi chấm bôi nhẹ vào nốt sùi mào gà, ngày 1-2 lần (Nếu khi bôi có hiện tượng đau rát nhiều thì chấm bôi ngày 1 lần hoặc cách ngày 1 lần). Hãy nhớ bôi chính xác vào nốt mụn, chấm ra ngoài sẽ gây đau rát vùng da lành. Chờ khoảng 1 phút để dung dịch được thấm sâu

Nếu lỡ chấm dung dịch HUPAVIR TCA 50 ra ngoài thì dùng vòi nước máy xả và rửa sạch ngay. Chấm vài ngày khi thấy nốt mụn sùi trắng và khô cứng (tức là mụn đã chết thì có thể cạy nhẹ, mụn bong hết là được). Nếu mụn chưa bong hết thì lặp lại quy trình chấm dung dịch HUPAVIR TCA 50 từ B1 như trên cho tới khi nốt sùi hoàn toàn biến mất. Tuyệt đối không được bóc non mụn (tức là mụn chưa chết, sẽ làm chảy máu và làm tổn thương da thịt). Khi bị chảy máu thì không được sử dụng dung dịch HUPAVIR TCA 50, phải chờ đến khi vết thương lành hẳn thì mới được sử dụng trở lại.

Sau khi chấm mụn bằng dung dịch HUPAVIR TCA 50, để khô khoảng tối thiểu 5 phút. Nên dùng kết hợp với kem bôi HUPAVIR, bôi lên các nốt mụn đã chấm dung dịch để hiệu quả được cao hơn.

Lưu ý:

- Khi chấm dung dịch phải chờ 1-2 phút để bề mặt của vị trí da bị bệnh khô hẳn thì mới đi làm việc khác

- Không rửa nước ngay sau khi bôi dung dịch, nếu phải tiếp xúc với nước thì dùng miếng dán cá nhân dán lại vị trí da bị bệnh đó hoặc sau 1 giờ bôi dung dịch thì mới được tiếp xúc với nước

- Không được bôi dung dịch vào vết da bị trầy xước, hoặc vùng da không bị bệnh. Nếu lỡ bôi nhầm thì dùng vòi nước máy xả và rửa sạch ngay. Nếu bị tổn thương da hay lở loét da thì phải ngừng bôi ngay và dùng nước muối 0,9% rửa sạch vết thương, bôi mỡ kháng sinh Tetracyclin 1% ngày 1-2 lần, bôi vài ngày để vết thương lành hẳn.

- Trường hợp dung dịch rơi vào da lành, da có thể bị chuyển màu đen. Sau đó da sẽ lành dần, và không để lại sẹo

- Chỉ dùng ngoài da. Thời gian chấm dung dịch ở lọ màu vàng tối đa trong 6 tuần. Nếu bệnh không tiến triển, xin vui lòng tham khảo ý kiến thầy thuốc.

Chống chỉ định: Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm

Không điều trị nốt sùi tại lỗ tiểu. Không được bôi vào mắt. Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của thầy thuốc

Bảo quản:

- Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Sở hữu số lưu hành TTBYT: Công ty TNHH Tân Hà Lan

Địa chỉ: Số 8, tô 13, cụm III, phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại tư vấn: 0963460883

Sản xuất theo License tại:

Công ty TNHH Dược phẩm MONAPHARM.

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số CB: 230001453/PCBA-HN

Sản xuất tại Việt Nam