



Viên đặt âm đạo **POLVAG**

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang đặt âm đạo Gelatin mềm chứa:
Clindamycin Phosphat BP

Phương trình đến Clindamycin 100mg
Clotrimazole BP.....100mg
Tinidazole BP.....100mg

Tá dược vừa đủ

Màu được phê duyệt được sử dụng trong vỏ viên nang Gelatin mềm.

CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA POLVAG

Các thành phần chính có trong 1 viên âm đạo Polvag

Clotrimazole : Clotrimazole có tính kháng nấm phổ rộng, tác động tốt lên tính thấm thấu của vách tế bào vi nấm nhờ khả năng can thiệp lên các lipid của màng. Clotrimazole được bài tiết ở đường tiêu và đường mật chỉ.

Clindamycin: Đây là một loại kháng sinh thuộc họ Lincosamid có tác dụng ức chế tổng hợp Protein của vi khuẩn nhờ vào khả năng liên kết với tiểu phần 50S của Ribosom. Khoảng hơn Clindamycin được dung nạp vào cơ thể sẽ liên kết với Protein huyết tương. Hoạt động này thường được chuyển hóa chủ yếu ở gan, thời gian bán thải của Clindamycin vào khoảng 2-3 giờ đồng hồ.

Tinidazol là dẫn chất imidazole, có tác dụng với cả động vật nguyên sinh và vi khuẩn kỵ khí bắt buộc như Bacteroides spp, Clostridium spp, Fusobacterium spp,... Cơ chế tác dụng của Tinidazol của vi khuẩn kỵ khí và nguyên sinh động vật là thuốc thâm nhập vào tế bào của vi sinh vật và sau đó phá hủy chuỗi DNA hoặc ức chế tổng hợp DNA.

CHỈ ĐỊNH:

Polvag thường được chỉ định trong điều trị viêm âm đạo, âm hộ hỗn hợp do một số loại vi khuẩn, nấm gây nên như: Gardnerellavaginalis, Mycophasma sp, Candida albicans, Mobilicus,...

Điều trị các nhiễm khuẩn do vi khuẩn kỵ khí

Nhiễm khuẩn phụ khoa: Viêm nội mạc tử cung, viêm cơ nội mạc tử cung, áp xe vòi buồng trứng

Viêm âm đạo không đặt hiệu

Nhiễm Trichomonas sinh dục

Ngoài ra, Polvag còn có thể được Bác sĩ chỉ định dùng trong các trường hợp khác.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

THẬN TRỌNG:

Nên cẩn thận khi dùng Polvag với phụ nữ mang thai, nhất là trong 3 tháng đầu thai kỳ. Nếu thật sự cần thiết hãy tham khảo ý kiến Bác sĩ trước khi sử dụng. Chưa có bằng chứng Polvag ảnh hưởng đến giai đoạn của thai kỳ. Cần phải cân nhắc giữa lợi ích khi dùng Polvag với khả năng gây hại cho thai nhi. Chưa có thông tin chính thức về việc Polvag có tác động đến sữa mẹ hay không, tuy nhiên phụ nữ đang cho con bú chỉ sử dụng khi có chỉ định của Bác sĩ.

CÁCH DÙNG:

Trước khi đặt Polvag, bạn cần vệ sinh vùng kín sạch sẽ. Có thể dùng nước muối loãng để vệ sinh, tránh dùng xà phòng hay chất tẩy rửa. Trường hợp muốn dùng dung dịch vệ sinh chuyên dụng, bạn cần có được sự cho phép của Bác sĩ.

Cách đặt: Nằm ngửa ở tư thế đầu gối co lên, hai chân dang ra. Dùng 2 ngón tay kẹp chặt viên Polvag rồi đặt vào âm đạo. Sau đó dùng 1 ngón tay để đẩy viên Polvag càng sâu càng tốt. Kết thúc việc đặt Polvag bạn khép chân lại và nằm nghỉ. Cần vệ sinh tay sạch sẽ cả trước và sau khi tiếp xúc với Polvag, cất gọn móng tay, có thể đeo bao cao su cho ngón tay khi đặt Polvag để đảm bảo an toàn và tránh làm tổn thương âm đạo.

LIỀU DÙNG:

Theo chỉ định của Bác sĩ: Liều lượng và tần suất dùng Polvag được đề cập chỉ mang tính tham khảo, đáp ứng với các trường hợp thường gặp.

Liều phổ biến: 1 viên/lần/ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ

Trường hợp bệnh nặng: 1 viên/lần, 2 lần/ngày vào buổi sáng và buổi tối

Tuyệt đối không tự ý tăng, giảm liều hoặc ngưng dùng trong bất kỳ trường hợp nào. Khi liều dùng không đáp ứng, nên báo ngay cho Bác sĩ để có biện pháp khắc phục kịp thời.

LƯU Ý:

Tác dụng của Polvag tương đối mạnh, vì thế sau sử dụng nếu không thấy triệu chứng thuyên giảm hãy báo ngay cho Bác sĩ.

BẢO QUẢN: Để nơi khô thoáng, tránh ánh sáng trực tiếp, tránh xa tầm tay trẻ em

QUY CÁCH: Hộp 1 vỉ x 7 viên

ĐƯỢC SẢN XUẤT BỞI: Renowed Life Sciences WHO-GMP Certified Co. Plot No.10&11, Sector 6-B, IIE, SIDCUL, Haridwar 249403, Uttarakhand (INDIA)

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG: