

# Pulireg PEG<sup>®</sup>

## 1. Nhận dạng, thành phần và mục đích của thiết bị y tế

Pulireg PEG là một thiết bị y tế có tác dụng nhuận tràng, thông qua hoạt động thẩm thấu, điều chỉnh đường ruột theo cách tự nhiên. Nó không được hấp thụ cũng như không lên men trong ruột, không gây kích ứng niêm mạc và được thải ra qua phân. Pulireg PEG đặc biệt thích hợp trong trường hợp táo bón mãn tính và đi cầu không đều thường xuyên. Trên thực tế, nhờ có ái lực với nước, Pulireg PEG làm mềm phân tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển mà không gây co thắt hoặc đau bụng hoặc các tình trạng khẩn cấp. Hiệu quả của nó không bị giảm theo thời gian.

### 1.1. Thành phần:

Mỗi gói chứa 5 g Macrogol 3350

Tá dược vừa đủ: silicon dioxide, hương vị, saccharin natri.

### 2. Bao gói:

Pulireg PEG có dạng bột pha dung dịch uống.

Hộp chứa 30 gói dùng một lần

### 3. Liều dùng và hướng dẫn sử dụng

Trẻ em từ 6 tháng đến 2 tuổi (lên đến 12 kg): 1-2 gói (mỗi gói 5 g) mỗi ngày

Trẻ em từ 2 đến 11 tuổi (từ 12 kg đến 20 kg): 2-4 gói (mỗi gói 5 g) mỗi ngày.

Trẻ em trên 11 tuổi (hoặc trên 20 kg): 2-6 gói (mỗi gói 5 g) mỗi ngày.

Pha loãng lượng một gói trong 62,5 ml (khoảng một nửa ly nước).

Có thể chia nhỏ liều lượng hàng ngày trong nhiều lần sử dụng. Liều có thể được tăng lên hoặc giảm tùy thuộc vào đáp ứng của từng cá nhân với mục đích điều trị. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo lời khuyên của bác sĩ trong mọi trường hợp. Chỉ sử dụng sản phẩm ở trẻ em sau khi được tư vấn y tế. Liều lượng tối đa thường không vượt quá 6 gói mỗi ngày

### 4. Chống chỉ định:

Không sử dụng Pulireg PEG nếu:

- Hẹp ruột
- Thủng ruột
- Bệnh viêm ruột (ví dụ như bệnh Crohn, viêm loét đại tràng, megacolon độc hại).

### Không dùng trong trường hợp tắc ruột

Không có kinh nghiệm về việc sử dụng trong thời kỳ mang thai và cho con bú do đó chỉ sử dụng Pulireg PEG khi cần thiết sau khi được tư vấn y tế.

Ở bệnh nhân suy thận không cần thiết phải điều chỉnh liều lượng. Thời gian điều trị với Pulireg PEG không được quá 2 tuần. Trong trường hợp cần thiết có thể điều trị lặp lại. Sử dụng kéo dài có thể cần thiết trong trường hợp táo bón khó chữa và/hoặc mãn tính. Táo bón như vậy có thể do thuốc, thuốc giảm đau (opioid) và để điều trị Parkinson (thuốc kháng cholinergic), hoặc xuất hiện trong trường hợp các bệnh như đa xơ cứng hoặc bệnh Parkinson có thể gây ra táo bón khó chữa.

### 5. Tác dụng phụ

Ở liều lượng cần thiết để đạt được hiệu quả điều trị, không có tác dụng phụ nào được tìm thấy.

Đôi khi có thể xuất hiện rối loạn dạ dày-ruột, borborygmi, đau bụng, buồn nôn và tiêu chảy nhẹ (đặc biệt là trong giai đoạn đầu). Hiếm khi có thể xảy ra hiện tượng quá mẫn cảm (nổi mẩn ngứa và nổi mề đay).

## Bustine

### Macrogol 3350 - Dispositivo Medico CE0426

### Utile in caso di constipazione

Tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trong trường hợp bất đầu có bất kỳ phản ứng phụ nào, ngay cả ngoài những phản ứng được liệt kê. Nếu các triệu chứng vẫn tiếp tục, hãy hỏi ý kiến bác sĩ. Nếu bạn quên dùng một liều, đừng dùng liều gấp đôi mà hãy đợi và uống liều tiếp theo

### 6. Tương tác với thuốc và Thực phẩm bổ sung

Cho đến nay, không có tương tác nào được biết đến với thuốc, để phù hợp, dùng sản phẩm cách nhau ít nhất 2 giờ từ khi dùng thuốc bằng đường uống hoặc bất kỳ loại thuốc nào khác (thuốc vi lượng đồng cân) hoặc thực phẩm bổ sung vì khả năng thẩm thấu của macrogol và tốc độ vận chuyển đường tiêu hóa tăng lên có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của chúng.

Tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn trước khi dùng Pulireg PEG trong trường hợp áp dụng các liệu pháp khác.

### 7. Bảo quản

Bảo quản gói chưa mở ở nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp hoặc nguồn nhiệt. Bảo quản thiết bị dưới 25°C.

### 8. Cảnh báo và biện pháp phòng ngừa

Hỗn dịch uống nên được dùng ngay khi mở sản phẩm.

Không sử dụng sản phẩm cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi.

Khuyến cáo không vượt quá liều đề xuất, vì liều cao hơn có thể gây ra các tác dụng phụ không mong muốn.

Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú chỉ nên dùng Pulireg PEG sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ.

Trong thời gian điều trị với Pulireg PEG, bạn nên tuân theo một chế độ ăn uống thích hợp và dùng các giải pháp bù nước (ORS) để ngăn ngừa tình trạng mất nước, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

Không sử dụng quá 30 ngày liên tục. Nếu các triệu chứng vẫn còn, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn.

Không dùng trong trường hợp không dung nạp sản phẩm.

Không dùng trong trường hợp quá mẫn với các thành phần và polyethylene glycol. Mỗi gói chỉ dùng một lần và chỉ nên mở khi sử dụng.

### 9. Hạn sử dụng

Không dùng Pulireg PEG sau ngày hết hạn in trên bao bì. Hạn sử dụng dùng để chỉ sản phẩm được bảo quản đúng cách trong bao bì.

### 10. Thải bỏ

Sản phẩm đã hết hạn sử dụng hoặc trong mọi trường hợp cần loại bỏ phải được xử lý theo quy định về quản lý chất thải của Cơ quan quản lý địa phương.

Không vứt bỏ sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm ra môi trường.

Cập nhật lần cuối: Tháng 11 năm 2022

SIIT S.R.L. - Via Ariosto 50/60 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) ITALY

03011269/1

