

TN 30620 (A)

528/158

**BỘ Y TẾ**  
**CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**  
**ĐÃ PHÊ DUYỆT**  
 Lần đầu: 22/06/2017



Thành phần:		
Thành phần	Tên khoa học	Hàm lượng
Cao khô hỗn hợp tương ứng với các dược liệu		220 mg
Kim ngân hoa	Flos Lonicerae	0,25 g
Bồ công anh	Herba Lactucae indicao	0,25 g
Đạt linh	Portia	0,24 g
Hương liên	Rhizoma Cephaelis	0,24 g
Hạt khế thảo	Splach Prunellae	0,24 g
Kê đầu ngựa	Fructus Xanthii Strumaris	0,24 g
Lần đầu	Fructus Forsythiae	0,24 g
Từ dược		Hàm lượng
Magnesi stearat	Magnesi stearat	10 mg

**Chỉ định:**  
 - Dùng điều trị dị ứng, mẩn ngứa, ban đỏ, mề đay.  
 - Phòng và điều trị mụn trứng cá, ung nhọt sưng đỏ.  
**Chống chỉ định:** Không dùng cho trường hợp mẩn, nhọt đã vỡ, người dương hư, tỳ vị hư hàn, thể hàn và người mẫn cảm với các thành phần của thuốc.  
**Liều dùng - Cách dùng:**  
 Liều dùng: Ngày uống 3 lần.  
 + Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: mỗi lần 3 - 4 viên.  
 + Trẻ em dưới 12 tuổi: mỗi lần 2 viên.  
 Cách dùng: Uống với nước đun sôi để nguội.

Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng

**TIÊU ĐỘC**  
 Giải độc - Di ứng - Mẩn ngứa - Mụn nhọt

*Thành phần thảo dược*

**Bảo quản:** Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30°C  
**Tiêu chuẩn:** TCCS  
**Để xa tầm tay trẻ em.**  
**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

**Nhà sản xuất:**  
**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM YÊN BÁI**  
 725 Đường Yên Ninh - TP Yên Bái  
 ĐT: 029.3852523 \* Fax: 029.3850364

SĐK:  
 Số lo SX:  
 Ngày SX:  
 HD:

8936021810163

Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng



**Tờ hướng dẫn sử dụng  
Viên nang TIÊU ĐỘC.**

**• Công thức cho 1 đơn vị đóng gói nhỏ nhất (1 viên nang cứng):**

<i>Hoạt chất:</i>	<i>Tên khoa học</i>	<i>Hàm lượng</i>	<i>Tiêu chuẩn</i>
Cao khô hỗn hợp tương ứng với các dược liệu		220 mg	TCCS
Kim ngân hoa	<i>Flos Lonicerae</i>	0,25 g	
Bồ công anh	<i>Herba Lactucae indicae</i>	0,25 g	
Bạch linh	<i>Poria</i>	0,24 g	
Hoàng liên	<i>Rhizoma Coptidis</i>	0,24 g	
Hạ khô thảo	<i>Spica Prunellae</i>	0,24 g	
Ké đầu ngựa	<i>Fructus Xanthii strumarii</i>	0,24 g	
Liên kiều	<i>Fructus Forsythiae</i>	0,24 g	ĐDVN IV
<i>Tá dược</i>		<i>Hàm lượng</i>	
Magnesi stearat	<i>Magnesi stearat</i>	10 mg	ĐDVN IV

- **Dạng bào chế:** Viên nang cứng.
- **Quy cách đóng gói:** 10 viên/vi, 5 vi/1túi methaligh + 1 tờ HDSD/1hộp; 10 vi/1túi methaligh + 1 tờ HDSD/1hộp.
- **Công năng:** Thanh nhiệt, giải độc, lương huyết, tiêu viêm.
- **Chỉ định:**
  - Dùng điều trị dị ứng, mẩn ngứa, ban sởi, mào đay.
  - Phòng và điều trị mụn trứng cá, ung nhọt sưng đau.
- **Liều dùng – Cách dùng:**
  - Liều dùng: Ngày uống 3 lần,
  - + Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Mỗi lần 3 - 4 viên.
  - + Trẻ em dưới 12 tuổi: Mỗi lần 2 viên.
  - Cách dùng: Uống với nước đun sôi để nguội
- **Chống chỉ định:** Không dùng cho trường hợp mụn nhọt đã vỡ, người dương hư, tỳ vị hư hàn, thể hàn và người có mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- **Tác dụng không mong muốn:** Trong suốt thời gian lưu hành, chưa thấy có phản hồi về tác dụng không mong muốn của thuốc.
- **Thận trọng:** Khi dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.
- **Tác dụng của thuốc khi lái xe, vận hành máy móc:** Không ảnh hưởng.
- **Kiêng kỵ, tương tác:** Nếu đang sử dụng các loại thuốc tân dược, cần uống xa các lần uống thuốc tân dược để tránh khả năng có thể gây tương tác giữa các thuốc với nhau.

- **Quá liều và cách xử trí:** Không dùng quá liều chỉ định. Khi có biểu hiện quá liều, ngừng sử dụng thuốc ngay lập tức, đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất, sử dụng các biện pháp cấp cứu thích hợp.
- **Bảo quản:** Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30<sup>0</sup>C.
- **Tiêu chuẩn:** TCCS
- **Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- **Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ. Thông báo bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc**

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM**

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

Mọi chi tiết xin liên hệ

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI**

Địa chỉ: Số 725 - Đường Yên Ninh – TP. Yên Bái – Tỉnh Yên Bái

ĐT: 0293 852 523

Fax: 0293 850 364

Yên Bái, ngày 02 tháng 02 năm 2017

**GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Thị Bình**



TUQ.CỤC TRƯỞNG  
P.TRƯỞNG PHÒNG  
**Đỗ Minh Hùng**