


1. Mẫu nhãn hộp

MẪU NHÃN THUỐC

172/18142



CENDEMUC
Acetyl cystein 200 mg

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 19 / 9 / 2014

WHO GMP
Box of 20 sachets x 1,5 g of powder

COMPOSITION:
Acetyl cystein 200mg
Excipients 1 sachet

INDICATIONS, USAGE, DOSEAGE, CONTRA-INDICATION, SIDE-EFFECTS: See enclosed leaflet.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. READ THE DIRECTIONS CAREFULLY BEFORE USE. STORE AT TEMPERATURES NOT EXCEEDING 30°C. KEEP IN A COOL, DRY PLACE. PROTECT FROM LIGHT.

WHO GMP
Hộp 20 gói x 1,5 gam thuốc bột

CENDEMUC
Acetyl cystein 200 mg



Manufactured by
CENTERPHARCO
118 Ngõ Dã Tự, Hà Nội
www.danabio.com

THÀNH PHẦN:
Acetyl cystein 200mg
Tá dược vừa đủ 1 gói

CÁCH DÙNG:
Dùng thuốc bột này để làm loãng chất nhầy trong phổi. Trước khi dùng, hãy uống nhiều nước. Dùng thuốc bột này để làm loãng chất nhầy trong phổi. Trước khi dùng, hãy uống nhiều nước. Dùng thuốc bột này để làm loãng chất nhầy trong phổi. Trước khi dùng, hãy uống nhiều nước.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TÁC DỤNG PHỤ: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI CÁC BỆNH VIỆN VÀ CÁC TRUNG TÂM YẾU TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN VÀ CÁC TRUNG TÂM YẾU TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN VÀ CÁC TRUNG TÂM YẾU TẾ.

THUỐC THUỘC TCCB

WHO GMP
Hộp 1 gói - Thuốc Bột

CENDEMUC
Acetyl cystein 200 mg



THÀNH PHẦN:
Acetyl cystein 200mg
Tá dược vừa đủ 1 gói

CÁCH DÙNG:
Dùng thuốc bột này để làm loãng chất nhầy trong phổi. Trước khi dùng, hãy uống nhiều nước. Dùng thuốc bột này để làm loãng chất nhầy trong phổi. Trước khi dùng, hãy uống nhiều nước.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TÁC DỤNG PHỤ: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI CÁC BỆNH VIỆN VÀ CÁC TRUNG TÂM YẾU TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN VÀ CÁC TRUNG TÂM YẾU TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN VÀ CÁC TRUNG TÂM YẾU TẾ.

THUỐC THUỘC TCCB



Mẫu nhãn gói:

Tờ hướng dẫn sử dụng:

Thuốc bột CENDEMUC (gói 1,5g)

Thành phần: Acetylcystein 200 mg

Tá dược: Dextro anhydrous, aspartam, hương dâu, Erythrosin, Lactose vd 1 gói.

Dược lực học: Là 1 chất amino - acid tự nhiên, Acetylcystein làm giảm độ quánh của đờm ở phổi có mũ hoặc không bằng cách tách đôi cầu nối disulfua trong mucoprotein và tạo thuận lợi để tống đờm ra ngoài bằng ho, dẫn lưu tư thế hoặc bằng phương pháp cơ học. Acetylcystein được dùng để chống gây độc cho gan do quá liều paracetamol bằng cách duy trì hoặc khôi phục nồng độ glutathion của gan là chất cần thiết để làm bất hoạt chất chuyển hoá trung gian của paracetamol gây độc cho gan.

Dược động học: Sau khi uống, Acetylcystein được hấp thu nhanh ở đường tiêu hoá, chuyển hoá tại gan và được thải trừ chủ yếu ở thận.

Chỉ định:

- Dùng làm thuốc tiêu chất nhầy trong bệnh nhầy nhớt, bệnh lý hô hấp có đờm nhầy quánh như trong viêm phế quản cấp và mạn và làm sạch đường quy trong mờ khí quản.
- Dùng làm thuốc giải độc trong quá liều paracetamol.

Liều dùng: - Làm thuốc tiêu chất nhầy: + Trẻ em từ 2 - 6 tuổi: 200 mg x 2 lần/ngày.

+ Người lớn: 200 mg x 3 lần/ngày.

- Làm thuốc giải độc quá liều paracetamol: Liều đầu tiên 140mg/kg, dùng dung dịch 5%; tiếp theo cách 4 giờ uống 1 lần, liều 70mg/ kg thể trọng và uống tổng cộng 17 lần.

Chống chỉ định: Tiền sử hen. Người mẫn cảm với Acetylcystein . Trẻ em dưới 2 tuổi.

Thận trọng: Phải giám sát chặt chẽ người bệnh có nguy cơ phát hen, nếu dùng cho người bệnh có tiền sử dị ứng. Nếu có co thắt phế quản, phải dùng thuốc phun mù giãn phế quản như salbutamol (thuốc beta - adrenergic chọn lọc, tác dụng ngắn) hoặc ipratropium (thuốc kháng muscarin) và phải ngừng acetylcystein ngay. Khi điều trị với acetylcystein có thể xuất hiện nhiều đờm loãng ở phế quản, cần phải hút để lấy ra nếu bệnh nhân giảm khả năng ho.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc dùng an toàn cho phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Không có ảnh hưởng gì.

Tác động không mong muốn của thuốc: Buồn nôn, nôn, buồn ngủ, nhức đầu, ù tai, viêm miệng, chảy nước mũi nhiều, phát ban, mề đay, co thắt phế quản kèm phản ứng dạng phản vệ toàn thân, sốt, rét run (hiếm gặp)

Tương tác thuốc: Acetylcystein là một chất khử nên không phù hợp với các chất oxy hoá. Không dùng đồng thời các thuốc ho khác hoặc bất cứ thuốc nào làm giảm bài tiết phế quản trong thời gian điều trị bằng Acetylcystein .

Sử dụng quá liều: Có triệu chứng như triệu chứng phản vệ nhưng nặng hơn nhiều: Đặc biệt là giảm huyết áp. Các triệu chứng khác bao gồm suy hô hấp, tan máu, đông máu rải rác nội mạch và suy thận. Tử vong đã xảy ra ở người bệnh bị quá liều khi đang điều trị nhiễm độc paracetamol. Điều trị quá liều theo triệu chứng.

Bảo quản: Nhiệt độ không quá 30⁰C, nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 1,5 gam

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Để xa tầm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ

Thuốc được sản xuất tại Công ty TNHH MTV Dược TW 3

Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự - Đà Nẵng. Điện thoại: 0511.3822767



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC TW 3



Hồng Minh Thưởng

