

HOÀN BỔ TRUNG ÍCH KHÍ P/H

Thành phần: (cho 1 hoàn mấm)

Bột Hoàng kỳ (<i>Pulveres radialis astragali membranacei</i>)	: 1,8g
Bột Đảng sâm (<i>Pulveres radialis codonopsis pilosulae</i>)	: 0,6g
Bột Cam thảo (<i>Pulveres radialis glycyrrhizae</i>)	: 0,6g
Bột Bạch truật (<i>Pulveres rhizomae atractylodis macrocephalae</i>)	: 0,6g
Bột Đường quy (<i>Pulveres radialis angelicae sinensis</i>)	: 0,4g
Bột Thăng ma (<i>Pulveres rhizomae cimicifugae</i>)	: 0,6g
Bột Sài hồ (<i>Pulveres radialis bupleuri</i>)	: 0,6g
Bột Trần bì (<i>Pulveres pericarpium citri reticulatae</i>)	: 0,6g
Cao đặc dược liệu (<i>Extractum</i>)	: 0,45g
Tương đương với:	
Gừng tươi (<i>Rhizoma Zingiberis</i>)	: 0,25g
Đại táo (<i>Fructus Ziziphi jujubae</i>)	: 2g
Tá dược (mật ong, nước tinh khiết)	: vừa đủ 8g



Dạng bào chế: Hoàn mấm.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 12 hoàn mấm x 8g; hộp 10 hoàn mấm x 8g.

Chỉ định:

Hoàn Bổ trung ích khí P/H có tác dụng điều bổ tỳ vị, thăng dương ích khí. Thuốc được dùng trong các trường hợp:

- Tỳ vị khí hư, biểu hiện: Cơ thể suy nhược, mệt mỏi, chán ăn, trướng bụng, khó tiêu, tự ra mồ hôi, người nóng, gầy, sắc mặt trắng bệch.
- Tỳ hư hạ hãm, biểu hiện: Phàn lảng, òa chảy lâu ngày, các bệnh về sa phủ tạng như sa sinh dục, sa trực tràng, sa dạ con, trĩ.
- Chảy máu kéo dài do trung khí hư như rong kinh, rong huyết, sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, viêm loét dạ dày - tá tràng mạn tính.

Cách dùng & liều dùng:

- Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 viên. Uống trước bữa ăn 2 giờ.
- Uống thuốc với nước đun sôi để nguội, nhai thuốc trước khi nuốt.

Tác dụng phụ:

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Chống chỉ định: Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

Thận trọng: Thận trọng khi dùng thuốc cho người cao huyết áp, phụ nữ có thai và cho con bú.

Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Thuốc chống chỉ định cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi, do vậy nên thận trọng khi sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú để đảm bảo an toàn cho thai nhi và cho trẻ bú mẹ.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Trong thời gian dùng thuốc, không nên ăn các thức ăn sống, lạnh.

Quá liều và cách xử trí: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi:

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng

Trụ sở: Số 98-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm Công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Website: www.dongduocphuchung.com.vn

Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222

Fax: 04. 33978024



TU QU CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Thu Thủy