

Rx Thuốc bán theo đơn

Binozyt® 200 mg/5 ml

Azithromycin monohydrat 200 mg/5 ml



THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÀNH PHẦN:

Hoạt chất: azithromycin monohydrat tương đương với 200 mg azithromycin cho mỗi 5 ml.

Mô tả & Quy cách đóng gói:

Binozyt 200 mg/5 ml là bột tinh thể màu trắng hoặc trắng nhạt. Sau khi pha trở thành hỗn dịch đồng nhất, có màu trắng đến trắng nhạt.

Bột pha hỗn dịch uống Binozyt 200 mg/5 ml được đóng trong chai nhựa có nắp an toàn chống trẻ em, dung tích 15, 30 và 37,5 ml.

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ

Azithromycin là một kháng sinh, thuộc nhóm kháng sinh macrolid. Thuốc được sử dụng điều trị các nhiễm trùng gây ra bởi các vi khuẩn:

- Nhiễm khuẩn ở phổi như là viêm phế quản, viêm phổi
- Nhiễm khuẩn amidan, họng và các xoang
- Nhiễm khuẩn tai
- Nhiễm khuẩn da và mô mềm, ngoại trừ các vết thương do bỏng bị nhiễm khuẩn
- Nhiễm khuẩn đường niệu và cổ tử cung do chlamydia.

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG

Phải luôn dùng thuốc theo như sự hướng dẫn của bác sĩ. Nên hỏi ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn không rõ điều gì.

Người lớn và trẻ em cân nặng > 45 kg:

Binozyt 200 mg/5 ml được dùng theo phác đồ điều trị 3 hoặc 5 ngày.

- Phác đồ điều trị 3 ngày: uống 12,5 ml (500 mg), 1 lần/ngày
- Phác đồ điều trị 5 ngày:
 - Uống 12,5 ml (500 mg) vào ngày thứ 1
 - Uống 6,25 ml (250 mg) vào ngày thứ 2,3,4 và 5

Đối với nhiễm khuẩn đường niệu và cổ tử cung do nhiễm Chlamydia, thuốc được dùng 1 liều duy nhất 25 ml (1000 mg).

Trẻ cân nặng < 45 kg:

Binozyt 200 mg/5 ml không phù hợp để sử dụng cho trẻ dưới 1 tuổi.

Binozyt 200 mg/5 ml được dùng theo phác đồ điều trị 3 hoặc 5 ngày. Lượng thuốc hàng ngày có hiệu quả tùy theo cân nặng của trẻ.

Bảng sau đây hướng dẫn về liều dùng thông thường của thuốc:

Phác đồ điều trị 3 ngày:

Cân nặng	Ngày 1-3	Cân nặng	Ngày 1-3
10 kg	2,5 ml	17 – 25 kg	5 ml
12 kg	3 ml	26 – 35 kg	7,5 ml
14 kg	3,5 ml	36 – 45 kg	10 ml
16 kg	4 ml	> 45 kg	12,5 ml

Phác đồ điều trị 5 ngày:

Cân nặng	Ngày 1	Ngày 2-5
10 kg	2,5 ml	1,25 ml
12 kg	3 ml	1,5 ml
14 kg	3,5 ml	1,75 ml
16 kg	4 ml	2 ml
17 – 25 kg	5 ml	2,5 ml
26 – 35 kg	7,5 ml	3,75 ml
36 – 45 kg	10 ml	5 ml
> 45 kg	12,5 ml	6,25 ml

Liều điều trị đau họng là trường hợp ngoại lệ. Bác sĩ cần kê đơn với một liều khác cho bạn.

Uống thuốc một lần trong ngày. Có thể dùng thuốc cùng hoặc không cùng thức ăn.

Có thể tránh vị đắng sau khi uống thuốc bằng cách uống nước trái cây ngay sau đó.

Uống Binozyt 200 mg/5 ml với các thuốc tiêu hóa

Nếu cần uống thuốc tiêu hóa, như là thuốc kháng acid, phải dùng Binozyt 200 mg/5 ml ít nhất một giờ trước hoặc 2 giờ sau khi uống thuốc kháng acid.

Cách đo lường liều

Một ống bơm 10 ml được đánh dấu mỗi 0,25 ml được cung cấp sẵn đi kèm theo hộp thuốc. Nó đi cùng với một bộ phận gắn vừa vặn với chai thuốc. Để đo lường liều:

- Lắc chai thuốc bột
- Lắp bộ phận gắn vào trong miệng chai
- Đặt phần cuối của ống bơm vào trong bộ phận gắn
- Úp ngược chai thuốc hướng xuống
- Kéo pittông để đo lường liều cần thiết
- Đặt chai thuốc thẳng đứng, tháo ống bơm, tháo bộ phận gắn ra khỏi chai và đóng nắp lại.

Hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn cần lời khuyên về cách đo lường liều thuốc.

Cho trẻ uống thuốc bằng cách dùng ống bơm

- Phải chắc rằng trẻ được đặt ở tư thế thẳng đứng
- Đặt đầu ống bơm cẩn thận vào miệng trẻ. Hướng đầu ống bơm vào bên trong má.
- Từ từ đẩy pittông của ống bơm xuống: Không được rút ống bơm ra nhanh. Thuốc sẽ chảy ra khỏi miệng trẻ.



SANDOZ
a Novartis company