

Acyclovir STADA®

THÀNH PHẦN

Mỗi 1 gam cream chứa acyclovir 50 mg

Tá dược: PEG-5-glycerol-stearat, dimethicon, cetyl alcohol, paraffin lỏng, vaselin trắng, propylen glycol, nước tinh khiết

CHỈ ĐỊNH

– Nhiễm virus herpes simplex da bao gồm herpes môi và herpes sinh dục khởi phát và tái phát.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

- Hãy theo các chỉ dẫn dưới đây trừ khi có bác sĩ kê toa Acyclovir STADA®. Hãy thực hiện đúng những chỉ dẫn này và/hay những chỉ dẫn của bác sĩ để đạt hiệu quả và an toàn trong trị liệu Acyclovir STADA®.
- Thoa một lớp cream mỏng vào các vùng da bị tổn thương 5 lần/ngày, cứ mỗi 4 giờ.
- Dùng một miếng gạc cotton lấy một lượng kem đủ để thoa vào vùng da bị nhiễm. Khi thoa thuốc Acyclovir STADA®, phải thoa không chỉ những vùng có dấu hiệu nhiễm herpes thấy được (phồng rộp, sưng tấy, đỏ) mà cả những vùng kế cận. Phải rửa sạch tay cả trước và sau khi bôi thuốc để tránh bội nhiễm cho vùng da bị tổn thương hoặc lây virus đến các vùng da khác chưa bị nhiễm.
- Lưu ý: Để có đáp ứng tốt nhất, điều trị bằng Acyclovir STADA® nên bắt đầu càng sớm càng tốt, như ngay khi có dấu hiệu đầu tiên của herpes (phồng rộp, ngứa, khó chịu, đỏ).
- Thời gian điều trị: Bác sĩ sẽ quyết định nên tiếp tục sử dụng Acyclovir STADA® trong bao lâu. Thông thường, điều trị liên tục trong 5 ngày nhưng tùy theo cá nhân và tiếp tục cho đến khi các vết phồng đóng mảy hay lành hẳn. Tuy nhiên, thời gian điều trị không quá 10 ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không được dùng Acyclovir STADA® nếu biết bị quá mẫn cảm với acyclovir hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Không được thoa thuốc Acyclovir STADA® lên niêm mạc (như niêm mạc miệng, mắt, âm đạo) để tránh kích ứng tại chỗ.

Các trường hợp được mô tả ở đây có liên quan đến một số điều kiện, mà trong đó cần sử dụng Acyclovir STADA® một cách đặc biệt thận trọng. Hãy hỏi ý kiến bác sĩ nếu như có bất kỳ một trong những điều kiện đã xảy ra trước đó. Hãy báo cho bác sĩ biết trước khi bắt đầu trị liệu nếu như bị tổn thương hệ miễn dịch nghiêm trọng (nghĩa là hệ thống miễn dịch cơ thể bị suy yếu nghiêm trọng).

THẬN TRỌNG

- Khi sử dụng Acyclovir STADA® ở vùng sinh dục hay hậu môn và sử dụng đồng thời với bao cao su ngừa thai, bao cao su có thể bị rách do thành phần paraffin và chất dầu đặc petroleum có trong Acyclovir STADA® làm giảm độ tin cậy với bao cao su.

TƯƠNG TÁC THUỐC

- Cho đến nay chưa có tương tác với các loại thuốc khác được biết đến.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

- Chưa có những thông tin về hiệu quả sử dụng kem Acyclovir STADA® trong thời kỳ mang thai ở người.

ẢNH HƯỞNG THUỐC ĐỐI VỚI NGƯỜI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không có.

TÁC DỤNG PHỤ

- Thoa thuốc Acyclovir STADA® có thể gặp cảm giác nóng, kim châm thoáng qua ở vùng da điều trị. Thỉnh thoảng bị đỏ, khô, đóng vảy ở vùng da điều trị.
- Hiếm gặp các phản ứng da (viêm da tiếp xúc) sau khi dùng Acyclovir STADA®. Thử nghiệm về khả năng gây dị ứng da của thuốc đã chứng minh phần lớn các phản ứng da là do tá dược hơn là do hoạt chất acyclovir. Có thể bị đau do viêm da tiếp xúc nếu các tác dụng phụ trên xảy ra rõ rệt và trên vùng da rộng hơn vùng da được điều trị bằng kem thuốc. Hãy hỏi ý kiến bác sĩ.

QUÁ LIỀU

Không có hiện tượng ngộ độc sau khi dùng quá liều.

Nếu dùng liều thấp hơn liều chỉ dẫn, tiếp tục điều trị theo chỉ định (không nên dùng lượng kem nhiều hơn bình thường và không thoa dày hơn).

Ngay khi tình trạng bệnh được cải thiện rõ rệt, vẫn nên dùng Acyclovir STADA® đủ thời gian để đạt được kết quả trị liệu tốt nhất (xem phần "Liều lượng và cách dùng; thời gian điều trị").

HẠN DÙNG: 60 tháng kể từ ngày sản xuất. Hạn dùng sau khi mở nắp là 12 tháng.

BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 25°C.

ĐÓNG GÓI: Tuýp 2 g, tuýp 5 g. Hộp 1 tuýp.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Để xa tầm tay trẻ em

Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Cần biết thêm thông tin chi tiết, xin hỏi ý kiến bác sĩ

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng

Sản xuất bởi STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germany

9261448

1603

VN