

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em



YUMANGEL

[Thành phần] Mỗi gói chứa:
Thành phần hoạt chất:

Almagat1,00g

Thành phần tá dược: Microcrystallin cellulose và natri carboxymethylcellulose, natri carboxymethyl cellulose, dung dịch D-sorbitol, sucrose, chlorhexidin acetat, dimethyl polysiloxan 25% (nhũ dịch Simethicon), hương bạc hà, lucta 45, cồn, nước tinh khiết.

[Dạng bào chế]: Hỗn dịch nhớt, màu trắng, có mùi thơm

[Chỉ định]

Làm giảm và điều trị triệu chứng của chứng dư acid dạ dày như ợ nóng, ợ chua ở người lớn và trẻ em trên 12 tuổi

[Liều dùng và cách dùng]

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống 1 gói hỗn dịch /lần x 3 lần/ngày, sau khi ăn 30 phút hoặc 1 giờ. Nếu lại xuất hiện cảm giác khó chịu có thể dùng thêm 1 gói trước khi đi ngủ.

Không dùng quá 8 gói mỗi ngày

Bệnh nhân cao tuổi: Không cần điều chỉnh liều ở nhóm bệnh nhân này

Bệnh nhân suy thận:

- Không dùng ở bệnh nhân suy thận nặng
- Bệnh nhân suy thận nhẹ đến trung bình nên dùng thuốc này một cách thận trọng. Nên tránh dùng liều cao do có thể tích tụ lâu dài các ion nhôm và magiê trong cơ thể.

Nếu các triệu chứng không thuyên giảm sau 14 ngày, nên đi khám bác sĩ

[Chống chỉ định]

Không dùng thuốc cho bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer.

Xuất hiện chảy máu đường tiêu hóa chưa được chẩn đoán, bệnh trĩ, phù nề, nhiễm độc thai nghén, tiêu chảy.



[Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc]

Trẻ em: Không nên dùng thuốc kháng axit cho trẻ em dưới 12 tuổi, vì chúng có thể có tồn tại một số bệnh khác chưa được phát hiện (ví dụ: viêm ruột thừa). Ở mức nhẹ nhất, có nguy cơ gia tăng magiê trong máu hoặc độc tính nhôm, đặc biệt nếu trẻ mất nước hoặc mắc bệnh thận.

Bệnh nhân suy thận

Thuốc không được khuyến cáo ở bệnh nhân suy thận nặng. Bệnh nhân suy thận nhẹ đến trung bình nên dùng thuốc này một cách thận trọng. Trong trường hợp này liều nhẹ nhất có thể được khuyến dùng. Nên tránh dùng liều cao do có thể tích tụ lâu dài các ion nhôm và magiê trong cơ thể.

Sử dụng cho bệnh nhân cao tuổi

Ở những bệnh nhân này, việc tiếp tục sử dụng thuốc kháng axit có chứa nhôm có thể làm trầm trọng thêm một số bệnh lý xương đang mắc (loãng xương), do làm giảm photpho và canxi.

Thuốc được sử dụng thận trọng ở những bệnh nhân có chế độ ăn ít photpho, bị tiêu chảy, kém hấp thu hoặc suy nhược nghiêm trọng, vì muối nhôm làm giảm sự hấp thụ của photpho, đặc biệt là điều trị kéo dài, làm giảm hàm lượng photpho trong máu (chán ăn, yếu cơ, khó chịu, v.v.) và không đủ khoáng chất cho xương (nhuyễn xương).

Bệnh nhân nên thông báo cho bác sĩ nếu có bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến chảy máu, chẳng hạn như nôn trớ hoặc phân đen.

Cảnh báo về tá dược

Thuốc có chứa sorbitol là nguồn cung cấp fructose. Nếu bác sĩ chỉ định rằng bạn hoặc con bạn không dung nạp được một số loại đường hoặc đã được chẩn đoán mắc chứng không dung nạp fructose di truyền (HFI) một căn bệnh di truyền hiếm gặp, trong đó bệnh nhân không thể phân hủy fructose thì không nên dùng thuốc này. Sorbitol có thể gây khó chịu đường tiêu hóa và tác dụng nhuận tràng nhẹ.

Thuốc có chứa sucrose bệnh nhân có các vấn đề di truyền hiếm gặp không dung nạp fructose, kém hấp thu glucose-galactose hoặc thiếu sucrase-isomaltase không nên dùng thuốc này

[Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú]

Nếu đang mang thai hoặc cho con bú hoặc người bệnh nghĩ mình mang thai hoặc dự định mang thai, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng thuốc này

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai

Nên tránh dùng thuốc lâu dài và liều cao trong thời kỳ mang thai do có nguy cơ xuất hiện các thay đổi ở thai nhi/trẻ sơ sinh

Nếu cần điều trị lâu dài, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để có chỉ dẫn phù hợp

Thời kỳ cho con bú

Nên tránh dùng thuốc lâu dài và liều cao trong thời kỳ cho con bú. Mặc dù một lượng nhỏ nhôm và magiê có thể được bài tiết qua sữa mẹ, nhưng nồng độ của chúng không đủ cao để gây tác dụng phụ ở trẻ bú mẹ

[Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc]:

Không gây ảnh hưởng.

[Tương tác, tương kỵ của thuốc]

• Tương tác của thuốc

Thuốc kháng axit làm thay đổi sự hấp thu của nhiều loại thuốc, do đó nhìn chung nên dùng cách ít nhất 3 giờ khi sử dụng với bất kỳ loại thuốc nào khác.

-Có những nghiên cứu mô tả sự giảm hấp thu khi sử dụng đồng thời các thuốc chứa almagat và thuốc không steroid (flufenamic hoặc mefenamic acid, indomethacin); thuốc chống loét (cimetidine, famotidine, ranitidine); thuốc điều trị tim digitalis (digoxin, digitoxin); thuốc chống loạn thần (chlorpromazine); thuốc điều trị loét dạ dày (lansoprazole); thuốc corticosteroid (prednisone); thuốc điều trị chứng động kinh (gabapentin) và thuốc điều trị nấm (ketoconazole). Sự giảm hấp thu có thể xảy ra do sự thay đổi pH đường tiêu hóa hoặc do hình thành phức hợp kém hòa tan

-Thuốc chứa almagat làm giảm hấp thu của các thuốc sau khi dùng đồng thời do hình thành phức hợp kém hòa tan: penicillamine, quinolon (ciprofloxacin), tetracycline (chlortetracycline, demeclocycline, doxycycline), muối sắt (sắt sulfat). Do đó, khuyến cáo sử dụng cách 3 giờ.

-Khi dùng almagat với quinidine làm tăng khả năng gây độc của quinidine do almagat gây kiềm hóa nước tiểu làm giảm bài tiết quinidine

-Almagat làm giảm nồng độ thuốc salicylat (axit acetylsalicylic) khi dùng cùng do almagat gây tăng thải trừ do tăng pH nước tiểu, đặc biệt với liều cao salicylate

-Tham khảo ý kiến bác sĩ trong trường hợp người bệnh chuẩn bị xét nghiệm thành phần của dạ dày, vì almagat có thể làm thay đổi kết quả của xét nghiệm.



- **Tương kỵ của thuốc**

Do không có nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác

[Tác dụng không mong muốn của thuốc]

Giống như tất cả các loại thuốc, almagat có thể gây ra các tác dụng phụ. Do khả năng hấp thu kém ở ruột, các tác dụng phụ của almagat rất hiếm khi xảy ra.

Trên bộ máy tiêu hoá: Tiêu chảy có thể xảy ra trong khi dùng thuốc. Triệu chứng này hết khi dùng thuốc

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

[Quá liều và cách xử trí]

Quá liều: Nó có thể gây ra giảm phosphat huyết và loãng xương khi điều trị kéo dài với liều cao hoặc ở những bệnh nhân trên một chế độ ăn uống phot pho thấp.

Cách xử trí khi dùng thuốc quá liều: Trường hợp quá liều thì áp dụng cách điều trị triệu chứng.

[Quy cách đóng gói]: 15ml x 20 gói /hộp

[Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc]

Điều kiện bảo quản: Bảo quản dưới 30°C, trong bao bì kín và tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 2 năm kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: Nhà sản xuất

[Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất của thuốc]

Yuhan Corporation

219, Yeongudanji-ro, Ochang-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
Hàn Quốc

