

Acemuc[®]

KIDS

Acetylcysteine 100 mg
Thuốc cầm

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ
NHỮNG PHẢN ỨNG CÓ HẠI GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG
THUỐC.**

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC:

Cho 1 gói:

Thành phần hoạt chất: Acetylcysteine 100 mg
Thành phần tá dược: aspartam, hương cam (dạng bột),
sunset yellow (yellow color No.6), lactose.

DẠNG BẢO CHẾ:

Thuốc cầm, thoảng mùi cam, vị ngọt, tan trong nước.

CHỈ ĐỊNH:

Tiêu chất nhầy trong bệnh hô hấp có đàm nhầy quánh
như trong viêm phế quản cấp và mạn tính. Thuốc tác
động bằng cách làm cho đàm loãng hơn giúp ho khạc
đàm dễ dàng hơn.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Dùng đường uống. Hòa tan thuốc trong nửa ly nước
và dùng ngay.

Trẻ em từ 2 – 7 tuổi: 200mg/ lần x 2 lần/ngày.

Thời gian điều trị phụ thuộc vào bệnh sử và độ nặng
của bệnh, thông thường là 5 - 10 ngày trong giai đoạn
cấp. Trong trường hợp bệnh hô hấp mạn tính và dùng
thuốc kéo dài cần tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Trong thời gian điều trị, uống nhiều nước giúp hỗ trợ
tác dụng tiêu đàm của acetylcysteine.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Phenylketon niệu, vì thuốc có chứa aspartam.

Tiền sử hen (nguy cơ phản ứng co thắt phế quản với tất
cả các dạng thuốc chứa acetylcysteine)

Quá mẫn với acetylcysteine, các chất có cấu trúc hóa
học tương tự khác (ví dụ: carbocysteine, erdocysteine
hoặc mecysteine), hoặc bất cứ thành phần nào của
thuốc.

Trẻ em dưới 24 tháng tuổi.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

Ho là yếu tố cơ bản để bảo vệ phế quản – phổi nên cần
phải tôn trọng.

Hãy thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng

Acemuc Kids:

- Nếu trước khi dùng thuốc này người bệnh bị giảm khả
năng ho hoặc không thể ho, vì khi đó ho có thể cần
thiết để khạc đàm sau khi thuốc này làm đàm loãng
hơn.

- Nếu người bệnh đến hạn làm xét nghiệm máu hoặc
nước tiểu, vì thuốc này có thể ảnh hưởng đến một vài
xét nghiệm.

Phải giám sát chặt chẽ người bệnh có nguy cơ phát hen
nếu dùng acetylcysteine cho người có tiền sử dị ứng.

Khi điều trị với acetylcysteine có thể xuất hiện nhiều
đàm loãng ở phế quản, cần phải hút để lấy ra nếu
người bệnh giảm khả năng ho.

Nguy cơ xuất hiện sốc phản vệ sau khi dùng thuốc.

Cần thận trọng khi sử dụng ở những bệnh nhân bị loét
dạ dày – tá tràng. Nôn và buồn nôn do thuốc có thể làm
tăng nguy cơ xuất huyết tiêu hóa trên bệnh nhân đã có
bệnh lý này từ trước, và bởi vì nguy cơ về mặt lý thuyết
là các chất tiêu nhầy có thể gây tổn thương hàng rào
niêm mạc dạ dày.

Suy gan: Độ thanh thải toàn phần của acetylcysteine
trên bệnh nhân bị xơ gan suy giảm đáng kể và nửa
đời thải trừ gần như gấp đôi so với nhóm chứng khỏe
mạnh. Hiện không có thông tin xác định liều tối ưu
trên những đối tượng này.

Thuốc có chứa lactose; bệnh nhân bị bệnh di truyền
hiếm gặp của chứng bất dung nạp galactose, thiếu hụt
Lapp lactase hoặc kém hấp thu glucose – galactose
không nên dùng thuốc này.

Acetylcysteine có thể gây sai lệch kết quả xét nghiệm
xác định salicylates máu, ketone niệu.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Có thai: các kết quả nghiên cứu trên động vật thí
nghiệm cho thấy rõ thuốc không gây quái thai; tuy
nhiên, các dữ liệu này không cho phép suy rộng ra
trên người. Acetylcysteine đi qua hàng rào nhau thai
và được phát hiện trong máu cuống rốn. Như một biện
pháp thận trọng, nên tránh sử dụng acetylcysteine
trong thời kỳ mang thai.

Nuôi con bằng sữa mẹ: Hiện không có thông tin liên
quan đến sự bài tiết thuốc trong sữa mẹ, tránh dùng
trong lúc nuôi con bằng sữa mẹ do chưa có các dữ liệu.
Trong trường hợp rất thật cần thiết sử dụng hãy cân nhắc
đến lợi ích của mẹ và nguy cơ có thể có đối với thai nhi và
trẻ được nuôi bằng sữa mẹ.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc không gây ảnh hưởng đến việc lái xe hoặc vận
hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỶ CỦA THUỐC:

Việc phối hợp một thuốc long đàm, tiêu nhầy với các thuốc trị ho không có hoặc có làm giảm bài tiết phế quản (tác dụng giống atropin) là không hợp lý, bởi vì giảm phản xạ ho có thể dẫn đến tích tụ dịch tiết phế quản.

Than hoạt tính có thể làm giảm tác dụng của acetylcysteine.

Thử nghiệm in vitro khi pha trộn kháng sinh cephalosporin và acetylcysteine, cho thấy có một lượng kháng sinh bị bất hoạt. Lưu ý khi sử dụng, nên dùng kháng sinh uống ít nhất 2 giờ trước hoặc sau khi uống acetylcysteine.

Việc sử dụng đồng thời nitroglycerin và acetylcysteine gây hạ huyết áp đáng kể và dẫn đến giãn mạch tạm thời và có thể gây nhức đầu.

Acetylcysteine là một chất khử nên tương kỵ hóa học với chất oxy-hóa. Acetylcysteine cũng tương kỵ với một số kim loại như sắt, đồng, và cao su, trypsin, chymotrypsin. Cần tránh thuốc tiếp xúc với các chất đó.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:

Tuy hiếm gặp có thể thấy phế quản rõ ràng trong lâm sàng do acetylcysteine nhưng vẫn có thể xảy ra với tất cả các dạng thuốc chứa acetylcysteine.

Ít gặp, $1/1000 < ADR < 1/100$:

Miễn dịch: Tăng mẫn cảm

Tiêu hóa: Buồn nôn, nôn, tiêu chảy, viêm miệng, đau bụng

Tim mạch: Đổ búng, phù, tim đập nhanh, hạ huyết áp

Thần kinh: Nhức đầu, ù tai

Hô hấp: Chảy nước mũi nhiều, ran ngáy

Da: Phát ban, mề đay, phù mạch, ngứa

Toàn thân: Sốt

Hiếm gặp, $ADR < 1/1000$:

Tiêu hóa: Khó tiêu

Hô hấp: Co thắt phế quản, khó thở

Toàn thân: Phản ứng dạng phản vệ toàn thân, rét run

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Liều dùng acetylcysteine có khoảng cách an toàn khá rộng; tuy nhiên, quá liều có thể gặp khi dùng đường tiêm mạch hoặc đường uống liều cao trong điều trị ngộ độc paracetamol. Triệu chứng quá liều thường khá nặng: tụt huyết áp, ức chế hô hấp, co thắt phế quản, tán huyết, đông máu nội mạch rải rác, và suy thận; ngoài ra có thể có rối loạn tiêu hóa (như buồn nôn, nôn, tiêu chảy). Một số triệu chứng này có thể còn do tình trạng ngộ độc paracetamol gây ra.

Xử trí: Điều trị triệu chứng và chăm sóc nâng đỡ.

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC:

Nhóm dược lý điều trị: Thuốc tiêu đàm, mã ATC: R05CB01

Acetylcysteine là một chất làm long đàm, tiêu nhầy. Thuốc có tác dụng tiêu nhầy do nhóm thiol (-SH) tự do làm giảm độ quánh của đàm ở phổi có mủ hoặc không, bằng cách tách đôi cầu nối disulfua trong mucoprotein và tạo thuận lợi để tống đàm ra ngoài bằng ho, dẫn lưu tư thế hoặc bằng phương pháp cơ học.

Ngoài ra, acetylcysteine còn có tác động chống oxy-hóa trực tiếp, do có nhóm thiol tự do, nhóm này có khả năng tương tác trực tiếp với các nhóm ưa điện tích của các gốc tự do oxy-hóa.

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Sau một liều uống từ 200 mg đến 600 mg, acetylcysteine nhanh chóng được hấp thu, đạt nồng độ đỉnh trong huyết tương sau 30 phút đến 1 giờ. Trong thời gian hấp thu, acetylcysteine nhanh chóng được chuyển hóa thành cystein (chất chuyển hóa có hoạt tính dược lý), chất này mang nhóm thiol có đặc tính chống oxy-hóa, và cũng là tiền chất trực tiếp để tạo ra glutathion – là một chất chống oxy-hóa nội sinh chủ yếu trong cơ thể người. Sinh khả dụng khi uống thấp và có thể do chuyển hóa trong thành ruột và chuyển hóa bước đầu trong gan. Thể tích phân bố là 0,47 lít/kg, tỷ lệ gắn kết với protein huyết tương 83%. Độ thanh thải thận có thể chiếm 30% độ thanh thải toàn thân.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 30 gói x gói 0,5 g

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:

Bảo quản nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

HẠN DÙNG CỦA THUỐC

24 tháng kể từ ngày sản xuất

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG THUỐC:

Nhà sản xuất

**TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN SANOFI VIỆT NAM**

Lô I-8-2, Đường D8, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam