

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH DP NAM VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ

Viên nén CARBOMANGO

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM VIỆT 11A PHỐ CHO-P.TÂN THÀNH-Q.TÂN PHÚ-ĐT:38104268	
Viên nén	CARBOMANGO 100 VIÊN
CHỈ ĐỊNH: Trị đau bụng, no hơi, tiêu chảy	
LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG: - Người lớn: mỗi lần 4-6 viên, ngày 2 lần (sáng - chiều) - Trẻ em: * Từ 2 - 12 tuổi: mỗi lần 3 viên, ngày 2 lần (sáng - chiều) * Trên 12 tuổi: uống như liều người lớn Uống với nước đun sôi để nguội	CÔNG THỨC, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng để XA TẮM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG Để tránh biến đổi, thông số: Nhiệt độ 30°C ± 2°C Độ ẩm 75% ± 5% SĐK: TCCS SK tại 11A.B.C.PM.Chợ - P.T.Thành - Q.Tân Phú - TP.HCM - VN
Số lô SX: HD:	
Ngày SX:	

Ngày 09 tháng 5 năm 2011

Giám đốc



DS. ĐINH THỊ GHI

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ

Viên nén CARBOMANGO

Viên nén

CARBOMANGO

Chai 100 viên

CHỈ ĐỊNH: Trĩ đau bụng, no hơi, tiêu chảy

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:
- Người lớn: Mỗi lần 4 - 6 viên; ngày 2 lần (sáng - chiều)
- Trẻ em: Từ 2 - 12 tuổi: Mỗi lần 3 viên; ngày 2 lần (sáng - chiều)
Trên 12 tuổi: Uống như liều người lớn
Uống với nước đun sôi để nguội

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Không dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Để nơi khô ráo, thoáng mát.
Nhiệt độ 30°C ± 2°C. Độ ẩm 75% ± 5%

SX tại: 11A.B.C Phố Chợ, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM - VN

Viên nén

CARBOMANGO

Tiêu chuẩn: TCCS

Chai 100 viên

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM VIỆT
11A Phố Chợ, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM - VN - ĐT: 38104268

CÔNG THỨC CHO 1 VIÊN:
- Than hoạt tính (Carbo activatus)100 mg
- Kha tử (quả chiêu liêu) (Fructus Terminaliae chebulae)100 mg
- Màng cùi (vỏ quả) (Pericarpium Garciniae mangostanae).....100 mg
- Gelatin (Gelatinum)2 mg
- Natri benzoat (Natri benzoas)0,8 mg
- Tinh bột sắn (Amylum Manihoti) vớ 1 viên 400 mg

THẬN TRỌNG: Không sử dụng khi thuốc có hiện tượng biến chất (đổi màu, nấm mốc)

SDK:
Số lô SX: HD:
Ngày SX:

Ngày 09 tháng 5 năm 2011

Giám đốc



DS. ĐINH THỊ GHI

MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Viên nén CARBOMANGO

Công thức bào chế cho 1 viên nén:

- | | |
|--|------------------|
| - Than hoạt tính (Carbo activatus) | 100 mg |
| - Kha tử (Quả chiêu liêu) (Fructus Terminaliae chebulae) | 100 mg |
| - Măng cụt (vỏ quả) (Pericarpium Garciniae mangostanae) | 100 mg |
| - Gelatin (Gelatinum) | 2 mg |
| - Natri benzoat (Natrii benzoas) | 0,8 mg |
| - Tinh bột sắn (Amylum) | vđ 1 viên 400 mg |

Chỉ định: Trị đau bụng, no hơi, tiêu chảy.

Liều dùng – Liều dùng:

- Người lớn: Mỗi lần 4 – 6 viên, ngày 2 lần (Sáng – chiều).
- Trẻ em: * Từ 2 – 12 tuổi mỗi lần 3 viên, ngày 2 lần (Sáng – chiều)
* Trên 12 tuổi: Uống như liều người lớn

Uống với nước đun sôi để nguội.

Chống chỉ định: Không dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi.

Tương tác của thuốc: Chưa có báo cáo.

Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo. Thông báo cho thầy thuốc biết những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Thận trọng: Không sử dụng khi thuốc có hiện tượng biến chất (đổi màu, có nấm mốc).

Trình bày: Viên nén. Hộp 1 chai x 100 viên

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát. Nhiệt độ $30^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$. Độ ẩm $75\% \pm 5\%$.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn: TCCS

ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC

Sản xuất tại: 11 A-B-C Phố Chợ, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM VIỆT

11A PHỐ CHỢ, P. TÂN THÀNH, Q. TÂN PHÚ. TP. HỒ CHÍ MINH – VN

Điện thoại: 38104268 - 62997233

Ngày 09 tháng 5 năm 2011

Giám đốc



DS. Đinh Thị Ghi

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH DP NAM VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ

Viên nén CARBOMANGO

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM VIỆT 11A PHỐ CHO-P.TÂN THÀNH-Q.TÂN PHÚ-ĐT:38104263	
Viên nén	CARBOMANGO CHAI 100 VIÊN
CHỈ ĐỊNH: Trị đau bụng, no hơi, tiêu chảy	
LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG: - Người lớn: mỗi lần 4-6 viên, ngày 2 lần (sáng - chiều) - Trẻ em: * Từ 2 - 12 tuổi: mỗi lần 3 viên, ngày 2 lần (sáng - chiều) * Trên 12 tuổi: uống như liều người lớn Uống với nước đun sôi để nguội	CÔNG THỨC, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TRÁI LƯU: TRONG: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng để XA TẮM TAY TRƯỚC ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG Để tránh khô mắt, không để thuốc ở 30°C ± 2°C. Độ ẩm 75% ± 5% SĐK: TCCS Số đăng ký: 11A/B/C Phố Cho - P.T. Thành - Q.Tân Phú - TP.HCM - VN
Số lô SX: HD:	
Ngày SX:	

Ngày 09 tháng 5 năm 2011

Giám đốc



DS. ĐINH THỊ GHI

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ

Viên nén CARBOMANGO

Viên nén

CARBOMANGO

Chai 100 viên

Viên nén

CARBOMANGO

Chai 100 viên

CHỈ ĐỊNH: Trĩ đau bụng, no hơi, tiêu chảy

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

Người lớn: Mỗi lần 4 - 6 viên; ngày 2 lần (sáng - chiều)

Trẻ em: Từ 2 - 12 tuổi: Mỗi lần 3 viên; ngày 2 lần (sáng - chiều)

Trên 12 tuổi: Uống như liều người lớn

Uống với nước đun sôi để nguội

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Để nơi khô ráo, thoáng mát.

Nhiệt độ 30°C ± 2°C. Độ ẩm 75% ± 5%

SX tại: 11A.B.C Phố Chợ, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM - VN

Viên nén

CARBOMANGO

Tiêu chuẩn: TCCS Chai 100 viên

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM VIỆT

11A Phố Chợ, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM - VN - ĐT: 38104268

CÔNG THỨC CHO 1 VIÊN:

- Than hoạt tính (Carbo activatus)100 mg
- Kha tử (quả chiếu liêu) (Fructus Terminaliae chebulae)100 mg
- Măng cụt (vỏ quả) (Pericarpium Garciniae mangostanae).....100 mg
- Gelatin (Gelatinum)2 mg
- Natri benzoat (Natri benzoas)0.8 mg
- Tinh bột sắn (Amylum Manihoti) vđ 1 viên 400 mg

THẬN TRỌNG: Không sử dụng khi thuốc có hiện tượng biến chất (đổi màu, nấm mốc)

SĐK: _____

Số 10 SX: _____ HD: _____

Ngày SX: _____

Ngày 09 tháng 5 năm 2011

Giám đốc



ĐS ĐÌNH THỊ GHI

MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Viên nén CARBOMANGO

Công thức bào chế cho 1 viên nén:

- Than hoạt tính (Carbo activatus)	100 mg
- Kha tử (Quả chiêu liêu) (Fructus Terminaliae chebulae)	100 mg
- Măng cụt (vỏ quả) (Pericarpium Garciniae mangostanae)	100 mg
- Gelatin (Gelatinum)	2 mg
- Natri benzoat (Natrii benzoas)	0,8 mg
- Tinh bột sắn (Amylum)	vđ 1 viên 400 mg

Chỉ định: Trị đau bụng, no hơi, tiêu chảy.

Liều dùng – Liều dùng:

- Người lớn: Mỗi lần 4 – 6 viên, ngày 2 lần (Sáng – chiều).
- Trẻ em: * Từ 2 – 12 tuổi mỗi lần 3 viên, ngày 2 lần (Sáng – chiều)
* Trên 12 tuổi: Uống như liều người lớn

Uống với nước đun sôi để nguội.

Chống chỉ định: Không dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi.

Tương tác của thuốc: Chưa có báo cáo.

Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo. Thông báo cho thầy thuốc biết những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Thận trọng: Không sử dụng khi thuốc có hiện tượng biến chất (đổi màu, có nấm mốc).

Trình bày: Viên nén. Hộp 1 chai x 100 viên

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát. Nhiệt độ $30^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$. Độ ẩm $75\% \pm 5\%$.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn: TCCS

ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC

Sản xuất tại: 11 A-B-C Phố Chợ, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM VIỆT

11A PHỐ CHỢ, P. TÂN THÀNH, Q. TÂN PHÚ. TP. HỒ CHÍ MINH – VN

Điện thoại: 38104268 - 62997233

Ngày 09 tháng 5 năm 2011

Giám đốc



DS. Đinh Thị Ghi