

Thuốc nhỏ mắt, nhỏ tai

Ciprofloxacin 0,3%

Thành phần: Cho mỗi lọ 5 ml

Ciprofloxacin HCl tương ứng 15 mg Ciprofloxacin

Tá dược vừa đủ 5 ml

(Tá dược: Natri acetat, Acid acetic, Trilon B, Manitol, Nipazin, nước cất pha tiêm)

Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt, nhỏ tai

Qui cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 5 ml

Dược lực học:

Ciprofloxacin là kháng sinh bán tổng hợp có phổ kháng khuẩn rộng thuộc nhóm Quinolon, còn được gọi là các chất ức chế DNA gyrase. Ciprofloxacin có tác dụng tốt với các vi khuẩn kháng lại kháng sinh thuộc các nhóm khác (Aminoglycosid, Cephalosporin, Tetracyclin, Penicilin...) và được coi là một trong những thuốc có tác dụng mạnh nhất trong nhóm fluoroquinolon.

Dược động học:

Ciprofloxacin được hấp thu qua giác mạc vào thủy dịch. Hấp thu và phân phối Ciprofloxacin trong biểu mô mắt tăng lên khi mắt bị viêm và/ hoặc khiếm khuyết biểu mô. Theo nghiên cứu trên thỏ, thời gian bán thải của Ciprofloxacin trong thủy dịch là 1-2 giờ. Ciprofloxacin dùng nhỏ mắt được hấp thu qua đường toàn thân rất ít. Nồng độ đỉnh trong máu khi dùng Ciprofloxacin nhỏ mắt đạt được ít hơn khoảng 450 lần so với liều uống đơn 250 mg Ciprofloxacin.

Chỉ định:

- Trị các nhiễm khuẩn về mắt do các chủng nhạy cảm: Viêm giác mạc, viêm kết mạc.
- Các nhiễm khuẩn tai: Viêm tai ngoài, viêm tai giữa cấp, viêm tai giữa có mủ mạn tính và phòng ngừa trong phẫu thuật tai như phẫu thuật xương chũm.

Liều dùng, cách dùng:

* Nhỏ mắt:

- Viêm giác mạc:

- + Ngày thứ 1: Nhỏ 2 giọt /mỗi 15 phút trong 6 giờ đầu, sau đó nhỏ 2 giọt mỗi 30 phút trong suốt thời gian lúc thức còn lại trong ngày.
- + Ngày thứ 2: Nhỏ 2 giọt/ mỗi 1 giờ.
- + Ngày thứ 3 đến ngày thứ 14: Nhỏ 2 giọt mỗi 4 giờ.
- + Thời gian điều trị nên kéo dài từ 2 tuần, hoặc có thể đến 3 tuần nếu chưa thấy có hiện tượng tái tạo biểu mô hóa giác mạc.

- Viêm kết mạc:

2 ngày đầu: Nhỏ 1-2 giọt/ mỗi 2 giờ.

5 ngày tiếp theo: Nhỏ 1-2 giọt/mỗi 4 giờ.

* Nhỏ tai:

- Nhỏ vào tai 2 - 3 giọt, mỗi lần dùng cách nhau 2 - 3 giờ.

- Nằm hoặc giữ tai nghiêng khoảng 2 phút để thuốc không chảy ra ngoài.

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với Ciprofloxacin hay các thành phần của thuốc.

- Có tiền căn quá mẫn với các Quinolon.

Thận trọng:

- Cần thận khi dùng Ciprofloxacin kéo dài vì có thể làm tăng sinh những chủng vi khuẩn không nhạy cảm gây bội nhiễm.

Không nên mang kính áp tròng khi sử dụng.

Tương tác thuốc:

Chưa thấy có tương tác với Ciprofloxacin ở dạng thuốc nhỏ mắt.

Tác dụng không mong muốn:

Phản ứng phụ thường gặp nhất là cảm giác rát bỏng hay khó chịu. Các phản ứng dị ứng ít gặp như: ngứa, xung huyết, chảy nước mắt, cảm giác dị vật trong mắt...

Thông báo cho Bác sĩ biết những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy:

Có thể xảy ra tác dụng phụ như mắt nhạy cảm ánh sáng, giảm thị lực vì vậy nên cẩn thận khi dùng cho lái xe hay vận hành máy.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Phụ nữ có thai và cho con bú:

Chưa có nghiên cứu rõ ràng. Nên sử dụng thận trọng.

Sử dụng quá liều:

Nếu vô tình nhỏ quá liều nên lập tức rửa mắt bằng nước sạch và đến trung tâm y tế gần nhất để kiểm tra xử lý.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Lọ thuốc đã mở không sử dụng quá 15 ngày.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến Bác sĩ

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Số 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn,

Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Tel: 0256. 3846040 * Fax: 0256. 3846846